

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evitar el contacto con los ojos ya que causa irritación moderada.
- Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel ya que puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar la inhalación del producto.
- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- Durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas utilizar ropa protectora y equipos de protección indicados en la etiqueta (ver pictograma).
- Después de la aplicación lavarse con abundante agua fría y jabón.
- Conservar **HERBAGLIF** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
- No almacenar este producto en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

-GRUPO QUÍMICO: ACIDO FOSFÓNIC

- En caso de ingestión: En caso de ingestión, si la persona está consciente hacer ingerir gran cantidad de leche, clara de huevo, solución de gelatina y si no hay nada de esto disponible, 1 ó 2 vasos de agua el vómito no se recomienda, aunque puede ocurrir espontáneamente. Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente al médico.
- En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial. Avisar al personal médico.
- En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.
- Síntomas de intoxicación: Dolor oral y de garganta; erosión/ulceración de mucosa; vómito; diarrea; estado mental anormal; oliguria/anuria; acidosis metabólica; hipertermia; edema pulmonar; shock.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CICOTOX: 0800-13040. CIPROSQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0800-10200. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

HERBAGLIF®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Glifosato 480 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 444 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.

FORMULADO POR:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED.
Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA



**IMPORTADOR Y
DISTRIBUIDOR:**

CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150, Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

Contenido Neto: **200 Litros**

Nº de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Modo de preparación:

Verter el producto en un recipiente pequeño (cubeta), hacer una premezcla con todo el producto a usar y un poco de agua hasta que se forme una suspensión uniforme, la misma que se vierte en un tanque donde se hará la mezcla final y el cual esté lleno al 50% de su capacidad; agitarlo y luego completar el agua a utilizar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/Cilind.	L/ha		
Naranja dulce	Coquito o grama dulce	<i>Cyperus rotundus</i>	2	4	30	0,5
	Grama china (grama lote)	<i>Sorghum halepense</i>	2	4	30	0,5
Mandarina	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	--	2-3	14	0,1
	Grama dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	--	2-3	14	0,1
Alcachofa	Grama china	<i>Sorghum halepense</i>	--	2-3	14	0,1
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	--	2-3	14	0,1
Espárrago	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	--	2-3	5	0,1
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	--	2-3	5	0,1
Mango	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>	--	2-3	14	0,1
	Patá de gallina	<i>Eleusine indica</i>	--	2-3	14	0,1
Pimiento	Cebadilla	<i>Echinochloa colona</i>	--	2-3	N.D.	0,1
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physaloides</i>	--	2-3	N.D.	0,1
Vid	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	--	3	5	0,5
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>	--	3	5	0,5
Granada	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	--	5	N.D.	0,1
	Grama dulce / pasto bermuda	<i>Cynodon dactylon</i>	--	5	N.D.	0,1
Palto	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>	--	5	7	0,1
	Grama dulce / pasto bermuda	<i>Cynodon dactylon</i>	--	5	7	0,1
Pápirka/ Jalapeño/ Morón/ Guajillo	Patá de gallina	<i>Eleusine indica</i>	--	2-3	N.D.	0,1
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	--	2-3	N.D.	0,1

*PC: Periodo de Carencia

**LMR.: Límite máximo de residuos.

N.D: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se pueden realizar tres aplicaciones al año, cuando las malezas estén presentes. El momento ideal para el control de las malezas perennes es próximo o durante la floración, y para anuales en estadio joven hasta la formación de 2 macollos. Realizar la aplicación en parcelas en activo crecimiento.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada luego de 24 horas cuando el producto ya ha sido absorbido por la planta y cuando el follaje este seco .

COMPATIBILIDAD:

La mezcla con otros herbicidas (como áreas residuales o triazinas) pueden reducir la actividad del glifosato. Se recomienda efectuar un ensayo previo a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD:

Debe aplicarse antes de la emergencia de los cultivos para evitar efectos fitotóxicos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

