

27 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Toxico por ingestión.
Ligeramente peligroso por inhalación, evite respirar la aspersión durante la mezcla y aplicación.
Moderadamente irritante a la piel.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.
Evite la aplicación como en todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto.
Después de la mezcla y aplicación, lávase bien, bañarse y cambiarse de ropa y lávase antes de volver a usarla.
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicamentos de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
Usar solamente el producto que viene en envases originales.
No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.
Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Piraclostrobin (Stribulina) y Difenoconazole: Triazole.
En caso de intoxicación por inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial si es necesario, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar inmediatamente al médico en caso que aparezca irritación.
En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.
En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vomito a menos que sea recomendado por el centro médico o un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

Nota al médico:

Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)
CIPROSQUIM: 080-060-847 - ESSALUD: 0801-1-10200
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido envasado, lavar tres veces el envase y verter la solución en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No permitir que organismos acuáticos entren en contacto con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
"Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

SQUARE®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole 250 g/L
Pyraclostrobin 78.70 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 708 - SENASA

INTEROC CUSTER

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:

INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:

INTEROC S.A.
Km 16.5 Via Daule
Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 1L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SQUARE® es un fungicida con acción protectante y curativa. Es absorbido por las hojas con translocación transaminar y acropetal. Inhibe la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia electrónica al complejo citocromo bc₁, inhibe la demielinación del estero y la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, detiene el desarrollo del hongo.

SQUARE® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciarla en el tanque de preparación, previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

SQUARE® se debe aplicar de manera que forme una cobertura uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/ha de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Quemado del arroz" o "Piricularia"	<i>Piricularia oryzae</i>	0.25 - 0.30	35	0.05 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Pinquito (<i>Capsicum annuum</i>)	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.20	3	0.05 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Esparago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.25	7	0.05 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Vio (<i>Vitis vinifera</i>)	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.15	35	1.00 ⁽¹⁾ 1.00 ⁽²⁾
Alveta (<i>Plum salinum</i>)	"Oidiosis"	<i>Erysiphe helae</i>	0.10 - 0.20	30	1.00 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.15	14	0.15 ⁽¹⁾ 2.00 ⁽²⁾

PC: Período de Carenza

(1) Difenoconazole, (2) Pyraclostrobin

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar máximo 2 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas/año con intervalo aproximado de 15 días o cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Evitar productos de fuerte reacción alcalina, ácidos y agentes oxidantes. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



SQUARE®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole 250 g/L
Pyraclostrobin 78.70 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 708 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

Título de Registro:

Importador y Distribuidor:

INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875

Oficina 300 - Miraflores

Tel.: (511) 614-5100

Lima - Perú

Formulador:

INTEROC S.A.

Km. 16.5 Via Daule

Guayaquil - Ecuador

Tel.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Contenido Neto : 500 ml

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

18 cm

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)

CIPROSQUIM: 080-050-847 - ESSALUD: 0801-1-10200

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/cel de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Quemado del arroz" o "Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25 - 0.30	35	0.05 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.20	3	0.05 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicatum</i>	0.20 - 0.25	7	0.05 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.15	35	0.05 ⁽¹⁾ 1.00 ⁽²⁾
Aveja (<i>Pisum sativum</i>)	"Oidiosis"	<i>Erysiphe betae</i>	0.10 - 0.20	30	1.00 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.15	14	0.15 ⁽¹⁾ 2.00 ⁽²⁾

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia

(1) Difenoconazole, (2) Pyraclostrobin



8 cm

1.2 cm

18 cm

SQUARE®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole 250 g/L
Pyraclostrobin 78.70 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 708 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

Titular de Registro,

Importador y Distribuidor:

INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875

Oficina 300 - Miraflores

Telf.: (511) 614-5100

Lima - Perú

Formulador:

INTEROC S.A.

Km. 16.5 Vía Daule

Guayaquil - Ecuador

Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación

N° de Lote

Contenido Neto

Fecha de Vencimiento

250 ml

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrelle esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TÉLFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)

CIPROSQUIM: 080-050-847 - ESSALUD: 0801-1-10200

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/leil de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Quemado del arroz" o "Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25 - 0.30	35	0.05 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.20	3	0.05 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.25	7	0.05 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	"Oidiois"	<i>Erysiphe necator</i>	0.15	35	0.05 ⁽¹⁾ 1.00 ⁽²⁾
Arveja (<i>Pisum sativum</i>)	"Oidiois"	<i>Erysiphe betae</i>	0.10 - 0.20	30	1.00 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.15	14	0.15 ⁽¹⁾ 2.00 ⁽²⁾

PC: Período de Carenia

(1) Difenoconazole, (2) Pyraclostrobin

LMR: Límite Máximo de Residuos

1.2 cm

8 cm

