

27 cm

SQUARE®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:
Difenoconazole 250 g/L
Pyraclostrobin 78.70 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 708 - SENASA

INTEROC CUSTER

Título de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
INTEROC S.A.
Km 16.5 Via Daule
Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 1L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Tratamiento de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Ligero y moderadamente peligroso por inhalación, evite respirar la suspensión durante la mezcla y aplicación.
Moderadamente irritante a la piel.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.
Durante la aplicación, como en todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto. Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Conservarse el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
Ocupar el producto en el lugar y momento indicado en la etiqueta y manipularse con cuidado.
Usar solamente el producto que viene en envases originales.
No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.
Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Pyraclostrobin (Strobilurina) y Difenoconazole (Triazole).
En caso de intoxicación por inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial si es necesario, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar inmediatamente al médico en caso que aparezca irritación.
En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.
En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el Centro médico o un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

Nota al médico:

Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)

CIPROSQUIM: 080-050-847 - (ESSALUD: 0801-1-10200)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilizado triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado de presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
"Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
"SQUARE" es un fungicida con acción protectante y curativa. Es absorbido por las hojas con translocación translinar y acropetal. Inhibe la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia electrónica al complejo citocromo bc1, inhibe la demielinación del esteroil y la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, detiene el desarrollo del hongo.

"SQUARE" se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una mezcla y seguidamente vaciarla en el tanque de preparación, previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

"SQUARE" se debe aplicar de manera que forme una cobertura uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	PG	LMR
	NOMBRE COMÚN	(L/lel de 200L)	(días)	(ppm)
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Quemado del arroz" o "Piricularia"	0.25 - 0.30	35	0.05" 0.02"
	"Oidium"	0.20	3	0.05"
Pimiento (<i>Capiscum annuum</i>)	"Mancha del peral"	0.20 - 0.25	7	0.05" 0.02"
	"Roya del espárrago"	0.15 - 0.25		
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	"Oidiois"	0.15	35	0.05"
Arveja (<i>Pisum sativum</i>)	"Oidiois"	0.10 - 0.20	30	1.00" 0.02"

LMR: Límite Máximo de Residuos

PG: Período de Cerecía

(1) Difenoconazole, (2) Pyraclostrobin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar máximo 2 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas/año con intervalo aproximado de 15 días o cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Evitar productos de fuerte reacción alcalina, ácidos y agentes oxidantes. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



18 cm

SQUARE®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole 250 g/L
Pyraclostrobin 78.70 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 708 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**

INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875

Orchiza 300 - Miraflores

Tel.: (511) 614-5100

Lima - Perú

Fecha de Formulación

N° de Lote

Contenido Neto

Fecha de Vencimiento

500 ml

Formulador:

INTEROC S.A.

Km. 16.5 Via Daule

Guayaquil - Ecuador

Tel.: (593 4) 288-1662

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

Teléfono para Emergencias Toxicológicas

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita). CIPROSQUIM: 080-050-847. ESSALUD: 0801-1-10200

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/cil de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Quemado del arroz" o "Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25 - 0.30	35	0.05 ^m 0.05 ^m
Pimiento (<i>Capiscum annuum</i>)	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.20	3	0.05 ^m 0.05 ^m
Esparago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.25	7	0.05 ^m 0.02 ^m
	"Roya del esparago"	<i>Puccinia asparagi</i>	0.15 - 0.25		
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	"Oidiois"	<i>Erysiphe necator</i>	0.15	35	0.05 ^m 1.00 ^m
Aveja (<i>Pisum sativum</i>)	"Oidiois"	<i>Erysiphe betae</i>	0.10 - 0.20	30	0.02 ^m

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carenia

(1) Difenoconazole, (2) Pyraclostrobin



18 cm

SQUARE®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole 250 g/L
Pyraclostrobin 78.70 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 708 - SENASA

INTEROC CUSTER

Título de Registro,

Importador y Distribuidor:

INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875

Oficina 300 - Miraflores

Tel.: (511) 614-5100

Lima - Perú

Fecha de Formulación

N° de Lote

Contenido Neto

Fecha de Vencimiento

250 ml

Formulador:

INTEROC S.A.

Km. 18.5 Vía Daule

Guayaquil - Ecuador

Tel.: (593 4) 288-1062

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrole esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita). CIPROSQUIM: 080-050-847. ESSALUD: 0801-1-10200

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/cil de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz (Oryza sativa)	"Quemado del arroz" o "Pyricularia"	Pyricularia oryzae	0.25 - 0.30	35	0.05 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
	"Oidium"	Leveillula taurica	0.20	3	0.05 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Pimiento (Capsicum annuum)	"Mancha del peral"	Stemphylium vesicarium	0.20 - 0.25	7	0.05 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
	"Roya del espárrago"	Puccinia asparagi	0.15 - 0.25		
Espárrago (Asparagus officinalis)	"Oidiois"	Erysiphe necator	0.15	35	0.05 ⁽¹⁾ 1.00 ⁽²⁾
	"Oidiois"	Erysiphe betae	0.10 - 0.20	30	0.05 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Vid (Vitis vinifera)					
Arveja (Pisum sativum)					

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carenia
(1) Difenoconazole, (2) Pyraclostrobin



