

PROYECTO DE ETIQUETA – ORCHESTRA x 500 ml

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, guardar en un lugar fresco y seco.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Este producto contiene hidrocarburo aromático. Inflamable.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- **Teléfonos de emergencia: EsSalud en línea 0801-10200 (opción 4, línea gratuita); CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita); FARMEX S.A. (01) 630-6400**
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



# ORCHESTRA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**Composición Química:**

Difenoconazole..... 250 g/L  
Aditivos.....c.s.p..... 1.0 L

Reg. N° PQUA 407-SENASA

Titular del Registro:

FARMEX S.A.

Fabricado:

Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.

Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park, Luhe, Nanjing, China 210047.



Formulado y distribuido por:  
**FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia 148 Piso 7 San Isidro  
Lima 27 – Perú.

Tel.: (01) 630-6400, Fax: (01) 630-6410

Contenido Neto: 500 ml

N° de Lote :

Fecha de Fabricación :

Fecha de Vencimiento:

NO  
CORROSIVO



INFLAMABLE

NO  
EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

ORCHESTRA es un fungicida sistémico con acción curativa y preventiva. Es absorbido por las hojas y posee traslocación acropétala con un largo período residual. ORCHESTRA actúa como un inhibidor de la demetilación del estero, inhibiendo la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo

ORCHESTRA se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**CUADRO DE USOS**

Cultivo	Enfermedad		Dosis (mL/cil)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Cebolla	Puntas secas	<i>Stemphylium vesicarium</i>	150 – 200	7	0,05
Café	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	250-300	7	0,05
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	100	21	0,5
Arveja	Oidiosis	<i>Erysiphe betae</i>	200	14	1
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	150	15	0,5

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN.** Aplicar a la presencia de los primeros síntomas, en zonas endémicas aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Aplicar difenoconazole una (01) vez por campaña, considerando dos campañas al año.

**PERÍODO DE REINGRESO.** No permitir reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación a niños, personal en general y animales.

**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD.** ORCHESTRA no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

