LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto es peligroso si es inhalado, evitar respirar el polvo ó nube de aspersión. Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoides
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón por 15 -20´.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua por 15´ mantenga los parpados abiertos.
- En caso de inhalación: mover al paciente al aire fresco, inmediatamente suministrar respiración artificial. Llamar al médico.
- En caso de ingestión: dar al paciente suficiente agua. Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente. No inducir al vómito, llamar al médico.
- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX : 0800-1-3040
  CISPROQUIM :0800-50847
  ESSALUD : 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depósitelo en lugar destinado por la autoridad local para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales ó en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO

CELERA 70 WP es un insecticida sistemico, que actúa por contacto e ingestión, trabaja interfiriendo la transmisión de estímulos en el sistema nervioso de los insectos, causando un bloqueo lo que da como resultado la parálisis y posterior muerte de los insectos.

Las aplicaciones de **CELERA 70 WP** se realizan en campo abierto. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico, valor referencial es 400 l/ha).

Frecuencia y época de aplicación
El número de aplicaciones va a depender del grado de infestación de la plaga generalmente es entre 1 a 2 aplicaciones por campaña y los momentos de aplicación son al inicio de las primeras infestaciones.

Periodo de reingreso.- Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

Compatibilidad.- **CELERA 70WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

Fitotoxicidad.- **CELERA 70WP** no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

Responsabilidad civil.- El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	gr/cil		
Tomate	"Mosca blanca"	*Bemisia tabaci*	60	7	8

L.M.R: Límite Máximo de Residuos

CELERA®
70 WP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Imidacloprid..... 700 g/Kg
Aditivos ..... 300 g/Kg

Reg. PQUA N° SENASA

CONTENIDO NETO: 1 KG

TITULAR DEL REGISTRO:
Point Andina S.A.
Calle Loreto MzA6 Lote 15
Santa Patricia II Etapa.
La Molina. Lima Perú
Tel: 3487-1018 Telefax: 349-9609

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Point Andina S.A.

FABRICADO Y FORMULADO POR:
POINT AGRO-CHINA LTD
Room 1505-1506 Diamond Business Centre
Nanxing Street, Shangcheng District
Hangzhou 31000. China
Tel.+86(0)571-86959101
Fax +86(0)571-28007617

Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO