

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ## PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Phosphonoalycine

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR AL TELÉFONO:
0800-1-3040 (CICOTOX)**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

GLITOX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glyphosate.....480 g/L

(Equivalente a 360 g de ácido glifosato)

Aditivos 520 g/L

Reg. N° 988-2000-AG-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO

Formulado por:
ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT
AND EXPORT CORPORATION
No. 37 Qing Chun Road, Hangzhou,
Zhejiang Province, P.R. China.

Importador y distribuidor:
CIPAGRO S.A.C
Calle Las Castañitas N° 138
Urbanización El Palomar San Isidro
ventas@cipagro.com.pe
Teléfono: 464-6854



Contenido Neto: 5 L

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GENERALIDADES:

GLITOX es un herbicida sistémico, post emergente, no selectivo para el control eficaz de malezas anuales y perennes en caña de azúcar, espárrago, mandarina, palto y vid. **GLITOX** se trasloda dentro de la planta, eliminando partes aéreas, raíces, rizomas, ocasionando la muerte total de las plantas emergidas. **GLITOX** no es persistente en el suelo.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

GLITOX se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. Aplicar sobre las malezas en crecimiento y suelos húmedos. Evitar contacto con el cultivo; las aplicaciones deben ser dirigidas a las malezas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS: Úsese sólo en los cultivos autorizados.

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. p.p.m
	Nombre común	Nombre Científico	%	L/ cil 200L		
Caña de azúcar	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	1,5	3	N.A.	N.A.
Espárrago	Gramma china Coquito	<i>Sorghum halepense</i> <i>Cyperus rotundus</i>	1,5	3	N.A.	0.5
Mandarina	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	1,0	2	N.A.	0.5
Palto	Gramma dulce Gramma china Amor seco	<i>Cynodon dactylon</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Bidens pilosa</i>	1,0	2	N.A.	N.A.
Vid	Rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>	1,0	2	N.A.	0.5
Mango	Yuyo Cadillo	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Cenchrus echinatus</i>	1,0	2 - 3	N.A.	0.2
Limon	Chamico Verdolaga	<i>Datura stramonium</i> <i>Portulaca oleracea</i>	1,0	2 - 3	N.A.	0.1

PC: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos **N/A:** No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La frecuencia se hará según la manifestación y la época de aplicación cuando las malezas presentan crecimiento vigoroso.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas durante las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas.

FITOTOXICIDAD:

Afecta el follaje de todas las plantas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

