Curtine-V®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:

Cymoxanil	:	80 g/kg
Mancozeb	:	640 g/kg
Aditivos	:	c.s.p. 1kg

Registro Nº 400-97-AG-SENASA

Silvestre
Protección Vegetal

Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú. Tel.: (01) 617-3300
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por:

JIANGSU AIJIN AGROCHEMICAL CO., LTD.
No.58 Shuangxiang Road, Hongshan
Fine-Chemical Zone, Nanjinng 21.

Contenido Neto: **500 g**

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

F. de Form:
Nº Lote:
F. de Venc:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico Cymoxanil: Cianoacetamida oxima
Grupo químico Mancozeb: Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
CURTINE-V® es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, mancozeb (fungicida de contacto) y cymoxanil (fungicida sistémico), que le brindan un efecto protector y curativo a la planta. Se recomienda usar **CURTINE-V®** para el control de enfermedades producidas por hongos oomycetos, siendo particularmente activo contra Phytophthora.
CURTINE-V® se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de la enfermedad en el cultivo.
Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña. Hacer una segunda aplicación 5 - 7 días después de la primera.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
CURTINE-V® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, ácidos, alcalinos y cobre, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
CURTINE-V® no es fitotóxico a los cultivos si se aplica a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico- químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Cuadro de usos: **"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L	kg/ha		
CEBOLLA	"Mildiu"	*Peronospora destructor*	500	-	7	0.5
PAPA	"Rancha"	*Phytophthora infestans*	500 - 750	-	15	0.5
PÁPRIKA	"Alternaria"	*Alternaria solani*	400 - 500	-	7	2
TOMATE	"Rancha"	*Phytophthora infestans*	500	-	15	0.5
VID	"Mildiu"	*Plasmopora viticola*	-	2	10	0.2 cymoxanil 5.0 mancozeb

LMR: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.