



"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: CURTINE-V® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, ácidos, alcalinos y cobre, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

INGENIERO AGRÓNOMO"

DOSIS		P.C.	L.M.R.
g/200L	kg/ha	(días)	(ppm)
500	-	7	0.5
500 - 750	-	15	0.5
400 - 500	-	7	2
500	-	15	0.5
-	2	10	0.2 (a) 5.0 (b)

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
(b) Mancozeb

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Curtine-V®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:
Cymoxanil : 80 g/kg
Mancozeb : 640 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Registro N° 400-97-AG-SENASA



Titular del Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:
JIANGSU AIJIN AGROCHEMICAL CO., LTD.
No.58 Shuangxiang Road,
Hongshan Fine-Chemical Zone,
Nanjing 211511. China.

Contenido Neto: 500 g
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:**
Cymoxanil: Cianoacetamida oxima
Mancozeb: Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CURTINE-V® 720 WP es un fungicida de acción de contacto y transitar, absorbido rápidamente por el follaje. Tiene un efecto curativo y actúa en la fase de incubación, previniendo daños en los cultivos. Contiene Cymoxanil, que controla el mildiú destruyendo esporas durante su germinación y limitando la formación de nuevas conidias, además de inhibir la división celular e interfiriendo con la síntesis de ARN. El mancozeb impide la actividad de enzimas sulfidrilicas, afectando la reproducción de ATP. Según el FRAC, **CURTINE - V® 720 WP** pertenece a los grupos Cianoacetamida oxime (Cymoxanil) y ditiocarbamatos (mancozeb). **CURTINE - V® 720 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (michilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para el control de mildiú en cebolla, se aplicará por campaña de 3 a 5 aplicaciones y entre 9 a 15 aplicaciones al año (3 campañas). Para controlar el tizón temprano en ají paprika, por campaña se aplicará de 4 a 6 aplicaciones y de 8 a 12 aplicaciones al año (2 campañas). Para el control del mildiú en uva, se recomienda de 3 a 5 aplicaciones durante la campaña (1 campaña al año). Para el control de tizón tardío en papa, se recomienda entre 3 a 5 aplicaciones durante la campaña y de 6 a 10 aplicaciones al año (2 campañas). Para controlar el tizón tardío en tomate, se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña y de 2 a 4 aplicaciones al año (2 campañas).

"CONSULTE CON UN

CULTIVO	ENFERMEDAD	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
CEBOLLA	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>
PAPA	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>
PÁPRIKA	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>
TOMATE	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>
VID	Mildiú	<i>Plasmopora viticola</i>

P.C.: Período de Carencia
(a) Cymoxanil





"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: CURTINE-V® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, ácidos, alcalinos y cobre, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

INGENIERO AGRÓNOMO"

DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
g/200L	kg/ha		
500	-	7	0.5
500 - 750	-	15	0.5
400 - 500	-	7	2
500	-	15	0.5
-	2	10	0.2 (a) 5.0 (b)

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
(b) Mancozeb

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Curtine-V®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:
Cymoxanil : 80 g/kg
Mancozeb : 640 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Registro N° 400-97-AG-SENASA



Titular del Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:
NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning District,
Nanjing. China.

Contenido Neto: 500 g
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:**
Cymoxanil: Cianoacetamida oxima
Mancozeb: Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CURTINE-V® 720 WP es un fungicida de acción de contacto y transitar, absorbido rápidamente por el follaje. Tiene un efecto curativo y actúa en la fase de incubación, previniendo daños en los cultivos. Contiene Cymoxanil, que controla el mildiú destruyendo esporas durante su germinación y limitando la formación de nuevas conidias, además de inhibir la división celular e interfiriendo con la síntesis de ARN. El mancozeb impide la actividad de enzimas sulfidrasas, afectando la reproducción de ATP. Según el FRAC, **CURTINE - V® 720 WP** pertenece a los grupos Cianoacetamida oxime (Cymoxanil) y ditiocarbamatos (mancozeb). **CURTINE - V® 720 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (michilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para el control de mildiú en cebolla, se aplicará por campaña de 3 a 5 aplicaciones y entre 9 a 15 aplicaciones al año (3 campañas). Para controlar el tizón temprano en ají paprika, por campaña se aplicará de 4 a 6 aplicaciones y de 8 a 12 aplicaciones al año (2 campañas). Para el control del mildiú en uva, se recomienda de 3 a 5 aplicaciones durante la campaña (1 campaña al año). Para el control de tizón tardío en papa, se recomienda entre 3 a 5 aplicaciones durante la campaña y de 6 a 10 aplicaciones al año (2 campañas). Para controlar el tizón tardío en tomate, se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña y de 2 a 4 aplicaciones al año (2 campañas).

"CONSULTE CON UN

CULTIVO	ENFERMEDAD	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
CEBOLLA	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>
PAPA	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>
PÁPRIKA	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>
TOMATE	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>
VID	Mildiú	<i>Plasmopora viticola</i>

P.C.: Período de Carencia
(a) Cymoxanil



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO





"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: CURTINE-V® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, ácidos, alcalinos y cobre, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

INGENIERO AGRÓNOMO"

DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
g/200L	kg/ha		
500	-	7	0.5
500 - 750	-	15	0.5
400 - 500	-	7	2
500	-	15	0.5
-	2	10	0.2 (a) 5.0 (b)

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
(a) Cymoxanil
(b) Mancozeb

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Curtine-V®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:
Cymoxanil : 80 g/kg
Mancozeb : 640 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Registro N° 400-97-AG-SENASA



Titular del Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:
PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.
Changfenghe Road, Nanjing,
Chemical Industrial Park Luhe District,
Nanjing, P.R. China.

Contenido Neto: 500 g
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:**
Cymoxanil: Cianoacetamida oxima
Mancozeb: Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CURTINE-V® 720 WP es un fungicida de acción de contacto y transitar, absorbido rápidamente por el follaje. Tiene un efecto curativo y actúa en la fase de incubación, previniendo daños en los cultivos. Contiene Cymoxanil, que controla el mildiú destruyendo esporas durante su germinación y limitando la formación de nuevas conidias, además de inhibir la división celular e interfiriendo con la síntesis de ARN. El mancozeb impide la actividad de enzimas sulfidrasas, afectando la reproducción de ATP. Según el FRAC, **CURTINE - V® 720 WP** pertenece a los grupos Cianoacetamida oxime (Cymoxanil) y ditiocarbamatos (mancozeb). **CURTINE - V® 720 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (michilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para el control de mildiú en cebolla, se aplicará por campaña de 3 a 5 aplicaciones y entre 9 a 15 aplicaciones al año (3 campañas). Para controlar el tizón temprano en ají paprika, por campaña se aplicará de 4 a 6 aplicaciones y de 8 a 12 aplicaciones al año (2 campañas). Para el control del mildiú en uva, se recomienda de 3 a 5 aplicaciones durante la campaña (1 campaña al año). Para el control de tizón tardío en papa, se recomienda entre 3 a 5 aplicaciones durante la campaña y de 6 a 10 aplicaciones al año (2 campañas). Para controlar el tizón tardío en tomate, se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña y de 2 a 4 aplicaciones al año (2 campañas).

"CONSULTE CON UN

CULTIVO	ENFERMEDAD	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
CEBOLLA	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>
PAPA	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>
PÁPRIKA	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>
TOMATE	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>
VID	Mildiú	<i>Plasmopora viticola</i>

P.C.: Período de Carencia
(a) Cymoxanil





"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: CURTINE-V® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, ácidos, alcalinos y cobre, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

INGENIERO AGRÓNOMO"

DOSIS		P.C.	L.M.R.
g/200L	kg/ha	(días)	(ppm)
500	-	7	0.5
500 - 750	-	15	0.5
400 - 500	-	7	2
500	-	15	0.5
-	2	10	0.2 (a) 5.0 (b)

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
(a) Cymoxanil
(b) Mancozeb

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Curtine-V®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:
Cymoxanil : 80 g/kg
Mancozeb : 640 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Registro N° 400-97-AG-SENASA



Titular del Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:
VAPCO (VETERINARY AND AGRICULTURAL PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.)
P.O. Box 17058 Amman 11195. Jordania.

Contenido Neto: 500 g
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:**
Cymoxanil: Cianoacetamida oxima
Mancozeb: Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CURTINE-V® 720 WP es un fungicida de acción de contacto y transitar, absorbido rápidamente por el follaje. Tiene un efecto curativo y actúa en la fase de incubación, previniendo daños en los cultivos. Contiene Cymoxanil, que controla el mildiú destruyendo esporas durante su germinación y limitando la formación de nuevas conidias, además de inhibir la división celular e interfiriendo con la síntesis de ARN. El mancozeb impide la actividad de enzimas sulfidrasas, afectando la reproducción de ATP. Según el FRAC, **CURTINE - V® 720 WP** pertenece a los grupos Cianoacetamida oxime (Cymoxanil) y ditiocarbamatos (mancozeb).
CURTINE - V® 720 WP se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (michilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para el control de mildiú en cebolla, se aplicará por campaña de 3 a 5 aplicaciones y entre 9 a 15 aplicaciones al año (3 campañas). Para controlar el tizón temprano en ají paprika, por campaña se aplicará de 4 a 6 aplicaciones y de 8 a 12 aplicaciones al año (2 campañas). Para el control del mildiú en uva, se recomienda de 3 a 5 aplicaciones durante la campaña (1 campaña al año). Para el control de tizón tardío en papa, se recomienda entre 3 a 5 aplicaciones durante la campaña y de 6 a 10 aplicaciones al año (2 campañas). Para controlar el tizón tardío en tomate, se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña y de 2 a 4 aplicaciones al año (2 campañas).

"CONSULTE CON UN

CULTIVO	ENFERMEDAD	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
CEBOLLA	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>
PAPA	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>
PÁPRIKA	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>
TOMATE	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>
VID	Mildiú	<i>Plasmopora viticola</i>

P.C.: Período de Carencia
(a) Cymoxanil

