

22.2 ± 0.3 cm

0.7 ± 0.2

0.3 ± 0.2

12.0 ± 0.3 cm

1.8 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- El producto es sensibilizante dérmico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o por inhalación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar a área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo Químico: Piretroide.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta o la hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

**CICOTOX: 0800 - 1 - 3040      NEOAGRUM SAC: 617-6400  
ALO ESSALUD: 0801-10200 (Gratis)**

- No tiene antídoto específico.
- Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para artrópodos benéficos y en estadios de desarrollo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**CAMPAL<sup>®</sup> PLUS 100 EC**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN:**

Alphacypermethrin..... 100 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 659 - SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:  
**NEOAGRUM S.A.C.**

**neogram**

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

**Contenido neto: 500 mL**

F. de Form.:  
N° de Lote: "Ver parte superior"  
F. de Venc.:

Formulado por:  
SINOCHEN NINGBO LTD  
21 Jiangxia St. Ningbo 315000  
CHINA

**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CAMPAL<sup>®</sup> PLUS 100 EC** es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión sobre lepidópteros, hemipteros, etc. a muy baja dosis. Debido a sus efectos insecticidas mata posturas y ninfas por contacto, y las larvas por contacto e ingestión.

**CAMPAL<sup>®</sup> PLUS 100 EC** se prepara la mezcla diluyendo la dosis en la mitad de agua del volumen total a utilizar, se agita bien y se completa con agua hasta llenar el cilindro.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha		
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0.2	0.4	14	0.2
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.25-0.3	--	14	0.1

P.C.: Periodo de carencia.

L.M.R.: Límites máximos de residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar la aplicación del producto cuando se observen las primeras posturas y/o larvas, previo monitoreo de campo.  
Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se recomienda reingresar al campo tratado después de las 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:**

**CAMPAL<sup>®</sup> PLUS 100 EC** puede ser empleado en mezclas con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes de uso frecuente.

**FITOTOXICIDAD:**

**CAMPAL<sup>®</sup> PLUS 100 EC** no es fitotóxico para el cultivo recomendado si se usa según lo indicado en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

