"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Evite contacto con la piel y ropa.

Causa irritación moderada a los ojos

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservese el producto en envases originales, herméticamente cerrados

Debe se almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.

No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimento o bebidas.

El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y /o animal, ni forraies. Utilice ropa protectora para ingresar al aérea tratada en las 24 primeras horas después de la

Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarillas, botas, careta de

protección, gafas y ropa protectora. Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarse antes de volver

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico; Cloronitrilo y Moforlinas

En caso de intoxicación, llevar al paciente al medico y muestre la etiqueta.

En caso de ingestión: No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente;

no inducir al vómito.

En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de inhalación: Mantener a la persona al aire libre y en reposo brindar respiración si fuera

Nota al medico: El tratamiento es sintomático, no se conoce antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700. ESSALUD: 411 8000 anexo 4. INFOSALUD: 0800-10-828. CETOX: (511)273-2318 Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u artrópodas beneficios.

No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

"Peligroso para organismo acuático".

No contaminar ríos, estangues o arroyos con los desechos o envases vacíos

No contaminar las fuentes de agua de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacía cuerpos de agua de al menos diez metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas fréaticas superficiales o en suelos altamente

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las

QUESTRUM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

CHOROTHALONIL	.500	g/L
DIMETOMORPH	.250	g/L
Aditivos	c.s.p	.1L

Reg. PQUA Nº: 712 - SENASA



Titular de Registro,

Importador y Distribuidor: INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442 Piso 16. Magdalena del Mar Lima - Perú

Telf.: (511) 614-5100

Fecha de Formulación N° de Lote Contenido Neto : 1L Fecha de Vencimiento

Formulador: INTEROC S.A.

Km 16.5 Via Daule Guayaguil - Ecuador Telf.: (593 4) 288 1662

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

QUESTRUMº es un fungicida con acción preventiva, de contacto, translaminar y sistémico; usado para el control de enfermedades como lo indica el cuatro de usos.

QUESTRUMº se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciarla en el tanque de preparación previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

QUESTRUM® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme de la area a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores . Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados,

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CHADRO DE USO Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(ml/200L)	(L/Ha)	(días)	(ppm)
Papa (Solanum tuberosum)	"Hielo (rancha)"	Phytophthora infestans	300 - 400	-	7	0.2 0.05
Cebolla (Allium cepa)	"Mildiu"	Peronospora destructor	400	-	14	0.5 ⁽¹⁾ 0.6 ⁽²⁾
Vid (Vitis vinifera)	"Mildiu"	Plasmopara viticola	-	1	50	3.0 ⁽¹⁾ 3.0 ⁽²⁾

PC: Período de Carencia

(1) Chlorothalonil, (2) Dimethomorph

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar QUESTRUM® cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. considerando un máximo de 2 aplicaciones por campaña para los cultivos de papa y cebolla; y una aplicación por campaña para el cultivo de vid.

LMR: Límite Máximo de Residuos

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar después de las primeras 24 hora luego de la aplicación.

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaquicidas. Excepto con productos de fuerte reacción alcalina, sulfatos, caldos cúpricos, azufre, diazinón, dodine, amitraz, y endosulfán.

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".





