

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Triazol + Estrobirulina**
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669  
CISPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- **ROYALTY 75 WG**, es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte del hongo.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- Número máximo de aplicaciones:  
En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.  
En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea.  
En Arroz: máximo aplicar, 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 a 14 días, considerando 2 campañas al año.  
En Espárrago: Realice máximo una aplicación (01) aplicación por campaña, dos (02) campañas al año.  
No aplicar ROYALTY 75 WG, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

**PERIODO DE REINGRESO**

- Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD**

- El producto **ROYALTY 75 WG** no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

- El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO   | PLAGA            |                               | DOSIS      |            |              | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm)    |
|-----------|------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común     | Nombre Científico             | kg/200 L   | kg /ha     | %            |                |                 |
| Cebolla   | Punta seca       | <i>Stemphylium vesicarium</i> | -          | 0.3 - 0.5  | -            | 14             | 0.02            |
|           | Oidium           | <i>Erysiphe necator</i>       | -          | 0.3        | 0.03         | 21             | 2.0*            |
| Vid       | Moho gris        | <i>Botrytis cinerea</i>       | -          | 0.3 - 0.35 | 0.03 - 0.035 | 21             | 5.0**           |
|           | Pyricularia      | <i>Pyricularia oryzae</i>     | -          | 0.2 - 0.25 | -            | 35             | 0.02            |
| Arroz     | Roya del caféto  | <i>Hemileia vastatrix</i>     | 0.2        | -          | -            | 30             | 0.1*            |
|           | Ojo de gallo     | <i>Mycena citricolor</i>      | 0.15 - 0.2 | -          | -            | 7              | 0.05**          |
| Café      | Ojo de gallo     | <i>Mycena citricolor</i>      | 0.15 - 0.2 | -          | -            | 7              | 0.05**          |
|           | Oidium           | <i>Leveillula taurica</i>     | 0.125      | 0.25       | -            | 7              | 0.05**          |
| Pimiento  | Oidium           | <i>Leveillula taurica</i>     | 0.125      | 0.25       | -            | 7              | 0.05**          |
| Espárrago | Mancha del peral | <i>Stemphylium vesicarium</i> | -          | 0.3        | -            | 100            | 0.02*<br>0.05** |

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carenia

\*Tebuconazole \*\*Trifloxystrobin



# ROYALTY

## 75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

**COMPOSICIÓN:**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Tebuconazole    | 500 g/kg   |
| Trifloxystrobin | 250 g/kg   |
| Aditivos        | c.s.p. 1kg |

Reg. PQUA N° 720 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301  
Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 250 g.

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD

N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO