"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO' "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: - Fete producto es de cuidado, no ingerir. - ROYALTY 75 WG, es un fungicida sistémico,

- de mezcla v aplicación.
- No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo. - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo,
- aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS - Grupo químico: Triazol + Estrobirulina - En caso de intoxicación, lleve al paciente

- inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-5-0847 CROP BUSINESS SAC : 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS PERIODO DE REINGRESO

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las y deposítelo en los sitios destinados por las

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacios.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre

- Este producto es de cuidado, no ingerir. - ROYALTY 75 WG, es un fungicida sistémico, - No comer, beber o fumar durante las operaciones cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte del hongo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN - Aplicar previa evaluación de la plaga.

- Número máximo de aplicaciones:
- En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
- En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea.
- En Arroz: máximo aplicar, 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 a 14 días, considerando 2 campañas al año.
- No aplicar ROYALTY 75 WG, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.
- autoridades locales para este fin.

 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
 AMBIENTE:

 Cuando es utilizado contra la la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la recursión y conservación del cuando es utilizado contra la recursión y contra la recur etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C.	LMR
	Nombre Común	Nombre Cientifico	kg/200 L	kg /ha	%	(dias)	(ppm)
Cebolla	Punta seca	Stemphylium vesicarium	-	0.3 - 0.5	-	14	0.02
Vid	Oidium	Erysiphe necator	-	0.3	0.03	21	2.0* 5.0**
	Moho gris	Botrytis cinerea	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035		
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
Café	Roya del cafeto	Hemileia vastatrix	0.2	-	-	30	0.1* 0.05**
	Ojo de gallo	Mycena citricolor	0.15 - 0.2	-	-		
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	0.125	0.25	-	7	0.5*
Espárrago	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	-	0.3	-	100	0.02*
Maíz	Mancha negra del maíz	Phyllachora maydis	-	0.1	-	30	0.02
	Roya	Puccinia sorghi	-	0.15	-		
Arándano	Cabeza de clavo	Alternaria tenuissima	0.05	-	0.025	7	2.0*



LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carencia















PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole	500 g/kg
Trifloxystrobin	 250 g/kg
Aditivos	 c.s.p. 1ka

Reg. PQUA Nº 720 - SENASA Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

> Importado y Distribuido por: CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo Nº 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido Neto: 250 a. Fecha de Vencimiento:

Formulado por: NANJING RHONQUIM CO., LTD Nº 26 Maiia Street, Naniing Jiangsu, 210009 CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**