Yarda® 500 WP

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos ..... c.s.p.1 kg

Registro PQUA Nº 311 - SENASA

Silvestre Protección Vegetal

Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@gruposilvestre.com.pe

Formulado y Envasado por:

SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province. China. Tel.: 86-574-87346015.
Fax.: 86-574-87263319

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **500 g**

Nº Lote
F. de Form.
F. de Venc.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico dicarboximida.
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, sólo bajo prescripción médica. Beber y enjuagar la boca con abundante agua, pero no suministre nada vía oral a un paciente en estado inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si la irritación es grave, ofrecer asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.

Nota al Médico
No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFÓNOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
SILVESTRE (01) 617-3300

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturando o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
Peligroso para los organismos acuáticos.

- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **YARDA® 500 WP** es un fungicida de contacto y preventivo desarrollado para el control de *Botrytis cinerea* en el cultivo de mandarina.
- **YARDA® 500 WP** actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta.
- **YARDA® 500 WP** puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de **YARDA® 500 WP** cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 1.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

YARDA® 500 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente utilizados en agricultura, excepto con ácidos y bases fuertes, ni agentes fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/cil 200L	kg/ha		
Ajo	"Pobredumbre blanca"	*Sclerotium cepivorum*	0.4	-	21	0.2
Alcachofa	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	0.5	0.5	14	0.02
Cebolla	"Moho gris"	*Botrytis squamosa*	-	0.80	14	0.2
Mandarina	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	0.20	0.50	5	1
Manzano	"Pudrición de las flores"	*Botrytis cinerea*	0.25	-	14	5
Palto	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	0.5	1.00	30	0.02
Tomate	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	0.20	-	7	0.5
Vid	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	-	1.00	14	10
Naranjo	"Pudrición de las flores"	*Botrytis cinerea*	-	1.50	14	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos **PC**: Período de Carencia.