

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
MONTANA: 419-3000

Contenido Neto: 250 ml

N° de Lote:

Fecha de Form:

Fecha de Venc.:



TOPADOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Spirodiclofen.....240 g/L
Aditivos.....csp 1 L

Reg. PQUA N° 723 – SENASA

Titular de Registro:

MONTANA

Formulado por:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED
12/F Lucky Building 39 Wellington
Street Central HK. China.

Importado y distribuido por:
MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este N° 6210
Ofi. 401, La Molina. Lima -Perú.
Teléfonos: (511) 4193000
E-mail: info@corpmontana.com



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	%	ml/200L		
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.02 - 0.03	40-60	14	0.4
Palto	Arañita marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	0.02 - 0.03	40-60	2	1
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.04	-	14	0.2

PC: Periodo de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos
En Vid considerar un gasto de agua de 1000 L/ha.

