

PROC
10 TB

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conserve el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.
- No transportar ni almacenar con alimentos y forrajes.
- Usar la mezcla inmediatamente después de prepararla.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:

ESSALUD: 411 8000 anexo 4, INFOSALUD: 0800-10-828.
CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido destruya el envase y despositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Cada tableta contiene de Ácido Giberlético. PROC10 se puede aplicar junto con un humectante dispersante para asegurar adherencia del producto.

Poner la tableta o parte de ella en un cilindro con agua de acuerdo a la dosis recomendada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 01 (una) aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

PROC 10 no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que aquí recomendamos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"Consulte a un ingeniero agrónomo"

CULTIVO	DOSIS (Nº de tabletas por cilindro de 200 L de agua)	PC (días)	LMR (ppm)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
VID	4 - 6	N.A	5	Crecimiento de Baya Aplicar cuando las bayas tengan de 10 mm a 12 mm de diámetro.

PC: Periodo de carencia (días); LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm), N.A: No aplica.



PROC
10 TB

PROC
10 TB

PROC 10 - TABLETAS 100gr (CAJA) - Marzo 2020

PROC[®]
10 TB

PROC[®]
10 TB

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

TABLETAS (TB)

COMPOSICIÓN:

Ácido Giberélico (GA3): 10.0%
Aditivos c.s.p..... 90%

Reg. PBUA N° 261 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.

Jr. San Sebastián 298,
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (01) 6328482



Formulador:

JIANGSU FENGYUAN BIOENGINEERING CO., LTD.
N° 6, Hongqi Road, Sheyang, Jiangsu.
CHINA

N° lote:

Cont. neto: 100 g (Envase x 10 tabletas)

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PROC[®]
10 TB

PRECAUCIÓN

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Conserve el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.
 - No transportar ni almacenar con alimentos y forrajes.
 - Usar la mezcla inmediatamente después de prepararla.
- PRIMEROS AUXILIOS:**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y siel contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:

ESSALUD: 411 8000 anexo 4, INFOSALUD: 0800-10-828.
CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya el envase y desposite en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado para este fin.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

"Consulte a un ingeniero agrónomo"

CULTIVO	DOSIS (Nº de tabletas por cilindro de 200 L de agua)	PC (días)	LMR (ppm)	EPOCA DE APLICACIÓN	
				5	4 - 6
VID		N.A		Crecimiento de Baya	Aplicar cuando las bayas tengan de 10 mm a 12 mm de diámetro.

PC: Período de carencia (días), LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm), N.A: No aplica.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- Cada tableta contiene de Ácido Giberélico. PROC10 se puede aplicar junto con un humectante dispersante para asegurar adherencia del producto.
- Poner la tableta o parte de ella en un cilindro con agua de acuerdo a la dosis recomendada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 01 (una) aplicaciones por campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO:

12 horas.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

PROC 10 no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que aquí recomendamos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PROC[®] 10 TB

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

TABLETAS (TB)

COMPOSICIÓN:

Ácido Giberélico (GA3): 10.0%
Aditivos c.s.p. 90%

Reg. PBUA N° 261 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.

Jr. San Sebastián 298,
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,

La Molina, Lima - Perú

Teléfono: (01) 6328482

Formulador:

JIANGSU FENGYUAN BIOENGINEERING CO., LTD.

N° 6, Hongqi Road, Sheyang, Jiangsu.

CHINA

N° lote:

Cont. neto: 5kg.

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

Etiquetado: PROC 10 x 100g, 12 cm x 19 cm, POSTERIOR





LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conserve el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.
- No transportar ni almacenar con alimentos y forrajes.
- Usar la mezcla inmediatamente después de prepararla.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta. En caso de contacto con los ojos lávalos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:
ESSALUD: 411 8000 anexo 4, INFOSALUD: 0800-10-828.
CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido destruya el envase y desposite en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
- Cada tableta contiene de Ácido Giberético. PROC10 se puede aplicar junto con un humectante dispersante para asegurar adherencia del producto.
- Poner la tableta o parte de ella en un cilindro con agua de acuerdo a la dosis recomendada.

"Consulte a un ingeniero agrónomo"

CULTIVO	DOSIS (Nº de tabletas por cilindro de 200 L de agua)	PC (días)	LMR (ppm)	EPOCA DE APLICACIÓN
VID	4 - 6	N.A	5	Crecimiento de Baya
				Aplicar cuando las bayas tengan de 10 mm a 12 mm de diámetro.

PC: Período de carencia (días); LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm), N.A: No aplica.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar un máximo de 01 (una) aplicaciones por campaña/año.
PERÍODO DE REINGRESO: 12 horas.
COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.
FITOTOXICIDAD: PROC 10 no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas en la etiqueta.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que aquí recomendamos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Etiqu. PROC 10 x 100g. (BOLSA) 12cm x 19 cm FRONTAL Marzo 2020

PROC[®]

10 TB

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

TABLETAS

COMPOSICIÓN:

Ácido Giberélico (GAs): 10.0%
Aditivos c.s.p..... 90%

Reg. PBUA N° 261 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.

Jr. San Sebastián 298,

Urb. El Sol de la Molina II Etapa,

La Molina, Lima - Perú

Teléfono: (01) 6328482



Formulador:

JIANGSU FENGYUAN BIOENGINEERING CO., LTD.

N° 6, Hongqi Road, Sheyang, Jiangsu.

CHINA

Número de lote:

Contenido Neto:

Fecha de Formulación:

Fecha de V encimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN