

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Use equipo de protección respiratoria durante la aplicación. El producto puede ser letal si es inhalado.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- No depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No permita animales entren en la zona de cultivo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Carbamato.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

Nota al Médico:

Por ser un inhibidor de la colinesterasa se recomienda no aplicar oximas, ni morfina, ni aminofilinas. No suministrar leche o grasa. En caso de intoxicaciones severas dar respiración artificial y oxígeno, duplicando la dosis de atropina.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- **Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración.**
- Es nocivo para la fauna benéfica.
- **Peligroso para aves**
- Tóxico para el ganado. No permita animales en el área tratada
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



TENAZ®
250 EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole..... 250 g/L
Aditivos c.s.p..... 1 L

Reg. PQUA N° 132 - SENASA
Titular del Registro: NEO AGRUM S.A.C.

Importado y distribuido por:

neogram

Calle Melitón Porras 392, Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

Formulado por:

HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD

64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou,

Zhejiang Province

CHINA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TENAZ 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa, utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades como: manchas foliares, pudriciones, royas, etc.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200 L	L/ha		
ALCACHOFA	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 – 300	0.5-0.6	7	0.05
CEBOLLA	Mancha del Peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200 - 250	-	14	0.2
ESPÁRRAGO	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	200	0.5	7	0.05
FRIJOL	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	100	0.2	3	2
MANGO	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	60 – 80	0.3-0.4	14	0.5
VID	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	100	0.5	14	2

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al observarse los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días durante períodos de humedad o ataques y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 4 aplicaciones por cultivo/campaña

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 72 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

