

Envase PEAD

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGABE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las próximas 48 horas.
- Use equipo de protección respiratoria durante la aplicación. El producto puede ser letal si es inhalado.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- No depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No permita animales entren en la zona de cultivo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Carbamato.
- En caso de intoxicación lleve al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de intoxicación severa dar respiración artificial y oxígeno, duplicando la dosis de atropina.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lávela con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3340 NEO AGRUM SAC: 017-6400

Nota al Médico:

Por ser un inhibidor de la colinesterasa se recomienda no aplicar costras, ni morfina, ni aminofilina. No suministrar leche o grasa. En caso de intoxicaciones severas dar respiración artificial y oxígeno, duplicando la dosis de atropina.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DEBECOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase. Vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice inutilizando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración.
- Es nocivo para la fauna acuática.
- Peligroso para aves.
- Tóxico para el ganado. No permita animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Contenido neto: 200 L

Nº de Lot:
F. de Form:
F. de Venc:

Fabricado y Formulado por
SINOCHEN KEXING LTD
21 Jiangsu St. Ningbo 315000
China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

TENAZ[®]
250 EW

FUNCICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole..... 250 g/L
Aditivos c.s.p..... 1 L

Reg. POLIA N° 132 - SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrum

Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 017-6400 / Fax: 017-6401

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TENAZ 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa, utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades como: manchas foliares, pudriciones, royas, etc.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200 L	L/ha		
ALCACHOFA	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	0.5-0.6	7	0.05
CAFE	Roya del Café	<i>Hemileia vastatrix</i>	250 - 300	-	30	0.1
CEBOLLA	Mancha del Pétalo	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200 - 250	-	14	0.2
ESPÁRRAGO	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	200	0.5	7	0.05
FRIJOL	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	100	0.2	3	2
MANGO	Oldum	<i>Oldum mangiferae</i>	80 - 80	0.3-0.4	14	0.5
VID	Oldum	<i>Uncinula necator</i>	100	0.5	14	2

P.C. Período de curación

L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al observarse los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días durante períodos de humedad o ataques y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 4 aplicaciones por cultivo/campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 72 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN: 03-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 22-02-13

2.175 cm

2017

Envase PEAD

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni fardos.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Use equipo de protección respiratoria durante la aplicación. El producto puede ser inhalado si es inhalado.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- No depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No permita animales entren en la zona de cultivo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Carbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lávela con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOK: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 017-8420

Nota al Médico:

Por ser un inhibidor de la colinesterasa se recomienda no aplicar coimas, ni morfina, ni aminoglucósidos. No suministrar leche o grasa. En caso de intoxicaciones severas dar respiración artificial y oxígeno, duplicando la dosis de atropina.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice inutilizado o perforado y déjelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración.
- Es nocivo para la fauna acuática.
- Peligroso para aves.
- Tóxico para el ganado. No permita animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



Contenido neto: 200 L

Nº de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Fabricado y Formulado por
SHOCHU-EMAGRO CO., LTD.
17-19th Fl. N° 33 He Nan Road (E),
Shanghai 200002
China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

TENAZ[®]
250 EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole 250 g/L

Aditivos c.a.p. 1 L

Reg. FQJA N° 132 - SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Calle Centurarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 017-8420 / Fax: 017-8420

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TENAZ 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa, utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades como: manchas foliares, pudriciones, royas, etc.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200 L	L/ha		
ALCACHOFA	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	0.5-0.6	7	0.05
CAFE	Roya del Café	<i>Hemileia vastatrix</i>	250 - 300	-	30	0.1
CEBOLLA	Mancha del Pétalo	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200 - 250	-	14	0.2
ESPÁRRAGO	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	200	0.5	7	0.05
FRÍJOL	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	100	0.2	3	2
MANGO	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	80 - 80	0.3-0.4	14	0.5
VID	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	100	0.5	14	2

P.C. Período de curación

L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar si observase los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días durante períodos de humedad o ataques y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 4 aplicaciones por cultivo/campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 72 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN: 03-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 22-02-13

2 175 cm

0018

Envase PEAD

48 cm

LEA CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni fumajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Use equipo de protección respiratoria durante la aplicación. El producto puede ser letal si es inhalado.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- No depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No permitir animales entren en la zona de cultivo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Carbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lávela con abundante agua y jabón.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTEX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 817-8400

Nota al Médico:

Por ser un inhibidor de la colinesterasa se recomienda no aplicar oximas, ni morfina, ni aminoflitas. No suministrar leche o grasa. En caso de intoxicaciones severas dar respiración artificial y oxígeno, duplicando la dosis de atropina.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego llévelo al punto de recolección y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración.
- Es nocivo para la fauna acuática.
- Peligroso para aves.
- Tóxico para el ganado. No permita animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

TENAZ[®]
250 EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:

Tabenozolol..... 250 g/L
Aditivos c.s.p..... 1 L

Reg. POLIA N° 132 - SENASA
Titular del Registro, Importador y distribuido por:
NEO AGRUM S.A.C.

neogram

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 817-8400 / Fax: 817-8401

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Fabricado y Formulado por:

PROCHEM COMPANY LIMITED

35F, Guomao Business Mansion

3008 Nanchu Rd. Lushu District

Shenzhen

China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TENAZ 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa, utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades como: manchas foliares, pudriciones, royas, etc.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200 L	L/ha		
ALCACHOFA	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	0.5-0.8	7	0.05
CAFE	Roya del Café	<i>Hemileia vastatrix</i>	250 - 300	-	30	0.1
CEBOLLA	Mancha del Perí	<i>Sclerotium vesicarium</i>	200 - 250	-	14	0.2
ESPÁRRAGO	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	200	0.5	7	0.05
FRIJOL	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	100	0.2	3	2
MANGO	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	80 - 80	0.3-0.4	14	0.5
VID	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	100	0.5	14	2

P.C. Periodo de curación

L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al observarse los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días durante periodos de humedad o ataques y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 4 aplicaciones por cultivo/campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 72 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



VERSIÓN: 03-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 22-02-13

2.175 cm-1

6019

Envase PEAD

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni fongos.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Use equipo de protección respiratoria durante la aplicación. El producto puede ser letal si es inhalado.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- No depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No permita animales entren en la zona de cultivo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Carbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 017-6400

Nota al Médico:

Por ser un inhibidor de la colinesterasa se recomienda no aplicar costras, ni morfina, ni aminoglucósidos. No suministrar leche o grasa. En caso de intoxicaciones severas dar respiración artificial y oxígeno, duplicando la dosis de atropina.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DEBECOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilízalo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración.
- Es nocivo para la fauna acuática.
- Peligroso para aves.
- Tóxico para el ganado. No permita animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



Contenido neto: 200 L
Nº de Lote:
F. de Form.
F. de Venc.

TENAZ[®]
250 EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:
Tebuconazole 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 132 - SENASA
Titular del Registro, Importador y distribuidor por:
NEO AGRUM S.A.C.

neogrum

Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 017-6400 / Fax: 017-6401

Fabricado y Formulado por
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO. LTD
84 Riverside Wharf Road, Changhe Town,
Hangzhou, Zhejiang Province
China

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TENAZ 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa, utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades como: manchas foliares, pudriciones, royas, etc.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200 L	L/ha		
ALCACHOFA	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	0.5-0.6	7	0.05
CAFE	Roya del Café	<i>Hemileia vastatrix</i>	250 - 300	-	30	0.1
CEBOLLA	Mancha del Peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200 - 250	-	14	0.2
ESPÁRRAGO	Roya	<i>Puccinia asperagi</i>	200	0.5	7	0.05
FRIJOL	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	100	0.2	3	2
MANGO	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	80 - 80	0.3-0.4	14	0.5
VID	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	100	0.5	14	2

P.C. Período de curación

L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al observarse los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones e intervalos de 7 días durante períodos de humedad o ataques y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 4 aplicaciones por cultivo/campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 72 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de acción alcalina. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN: 03-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 22-02-13

2.175 cm

0020

Envase PEAD

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni fardos.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las próximas 48 horas.
- Use equipo de protección respiratoria durante la aplicación. El producto puede ser letal si es inhalado.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- No depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No permita animales entren en la zona de cultivo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Carbamato.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOK: 0800 - 1 - 3040 NED AGRUM SAC: 017-6400

Nota al Médico:

Por ser un inhibidor de la colinesterasa se recomienda no aplicar oximas, ni morfina, ni amoníacas. No suministrar leche o grasa. En caso de intoxicaciones severas dar respiración artificial y oxígeno, duplicando la dosis de atropina.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración.
- Es nocivo para la fauna benéfica.
- Peligroso para aves.
- Tóxico para el ganado. No permita animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

TENAZ[®]
250 EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole 250 g/L
Aditivos c.a.p. 1 L

Reg. PQUA N° 132 - SENASA
Titular del Registro, importado y distribuido por:
NEDAGRUM S.A.C.

nec agrum

Calle Cantantes 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 017-6400 / Fax: 017-6401

Contenido neto: 200 L
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Fabricado y Formulado por:
DALIAN PLATINUM CHEMICALS CO. LTD.
2009 Block C, Rosewell Tianjing Cen Ruyi
81 Shuikou Dist Dalian
China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TENAZ 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa, utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades como: manchas foliares, pudriciones, royas, etc.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200 L	L/ha		
ALCACHOFA	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	0.5-0.6	7	0.05
CAFE	Roya del Café	<i>Hemileia vastatrix</i>	250 - 300	-	30	0.1
CEBOLLA	Mancha del Peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200 - 250	-	14	0.2
ESPÁRRAGO	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	200	0.5	7	0.05
FRIJOL	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	100	0.2	3	2
MANGO	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	80 - 80	0.3-0.4	14	0.5
VID	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	100	0.5	14	2

P.C. Período de curación

L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al observarse los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días durante periodos de humedad o ataques y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 4 aplicaciones por cultivo/campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 72 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



VERSIÓN: 03-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 22-02-13

0021