

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Evite respirar las gotas de aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El producto es nocivo por ingestión, inhalación y contacto con la piel.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento, en horas de baja insolación y viento.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado, en un lugar fresco, alejado del calor y bajo llave.
- No almacenar en casa habitación.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo Químico: Phosphorothiolate.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No existe antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El uso del producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

# COVERAGE<sup>®</sup>

## 400 EC

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN:**

Isoprothiolane..... 400 g/L  
Aditivos .....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 488-SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEO AG SAC

Calle Melitón Porras 392, Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401



Contenido neto: 500 ml

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD

64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou,

Zhejiang Province

CHINA



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**COVERAGE 400 EC** es un fungicida sistémico de amplio espectro, de acción preventiva y curativa.

**COVERAGE 400 EC** se absorbe por las hojas y raíces, con translocación acropétalo y basipétalo. Es empleado para el control de cercospora asparagi en el cultivo de espárrago.

**COVERAGE 400 EC** se prepara diluyendo la dosis en un poco de agua, luego se vierte esta solución al tanque de preparación, se agita y se completa con agua hasta el volumen deseado. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	ENFERMEDEDES		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	lt/200 lt	lt/ha		
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.5	1.0	14	0.01

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar **COVERAGE 400 EC** al observarse los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días durante periodos de humedad o ataques y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por cultivo/campaña

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **COVERAGE 400 EC** es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

**FITOTOXICIDAD:** **COVERAGE 400 EC** no es fitotóxico para el cultivo recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

