

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávase con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávase con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOK, 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego neutralízalo triturándolo o perforándolo y deposítalo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.



# RAYO<sup>®</sup> 500FW

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Atrazine 500 g/L  
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM SAC

**neoagrum**

Calle Centenarios 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 4 L

N° de Lot: \_\_\_\_\_  
F. de Form: \_\_\_\_\_  
F. de Venc: \_\_\_\_\_

Formulado por:  
MEGHMAN INDUSTRIES LTD.  
Block N° 400, 401 & 455 Village Chiswick TA  
Barnet Almedabad 382170  
India

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazine que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y soja de azúcar. RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de azúcar	Uchireña	Euphorbia spp	60 - 80 l	-	0,5
	Hoja mora	Solanum spigum			
	Raja papa o rabo de zorro	Setaria verticillata			
Maíz	Verdelago	Portulaca oleracea	1,5 - 30	30	0,25
	Yuyo	Amaranthus spp			
	Chamico	Datura stramonium			
	Melipicuno	Flourensia bahensis			
Sorgo	Hoja de galina	Chenopodium spp	1,5 - 30	30	0,25
	Pala de galina	Elysiene indica			
	Amar seco	Bidens pilosa			

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergentes temprana de las malezas (no más de 2,3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar los mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azules, aceites y productos fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz chocado y maíz chato. En campos de maíz perdidos a causa no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongadas resiliencia del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

VERSIÓN 04-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0010

48 cm

1 cm

1 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiate, lava la ropa contaminada y báñate con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarla con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilízalo triturándolo o perforándolo y deposítalo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



# RAYO<sup>®</sup> 500FW

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Atrazine 500 g/L  
Aditivos c.p. 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEO AGRUM SAC

**neogrum**

Calle Cantaritas 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 4 L

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

Farmulado por:  
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.  
8th Floor, Gasinjiahuangye Centre, Shunhua Road  
750W, Jinan, Shandong  
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y palma de azúcar.  
RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	lechuga	Euphorbia spp.	6.0 - 8.0	-	0.5
	hierba mora	Solanum nigrum			
	sorgo pigra o raba de zorro	Selena verticillata			
Maíz	verdugo	Portulaca oleracea	1.5 - 3.0	30	0.25
	yuyo	Amaranthus spp.			
	cañazo	Datura stramonium			
	matagüano	Flaveria bidentata			
Sorgo	hierba de gato lirado	Chenopodium spp.	1.5 - 3.0	30	0.25
	pata de gallo	Echinochloa indica			
	amor seco	Bidens pilosa			

P.C. Periodo de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y los bajos o suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con fungicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.  
**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados e leguminosas, maíz choco y maíz chato. En campos de maíz perdidos o caudales se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines al que es recomendado, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

14.5 cm

2.175 cm

CG11

48 cm

1 cm

1 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cíbrlese, lleve la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávela con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido: enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para esta fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva al envase triple lavado al centro de acople autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.

# RAYO<sup>®</sup> 500FW

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Atrazina 500 g/L  
Adyuvante 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM SAC

**neogrum**

Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 4 L

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

Formulado por  
SINOHEM AGRO CO., LTD  
17-19 th Floor, N°33 He Nan Road(S) Shanghai,  
200002  
CHINA

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar. RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lechera Herbivora Papa papa o rabo de toro	Euphorbia spp Solanum nigrum Sida sp	60-80	-	0.5
Maíz	Yuyo Chamisco Malagustano	Parthenocissis Amaranthus spp Datura stramonium Flavina dolens	15-30	30	0.25
Sorgo	Herbivora de gallinazo Pala de gallina Amarisco	Chenopodium spp Eleusine indica Bidens pilosa	15-30	30	0.25

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación. Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

**PERIODO DE RENGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.  
**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, urea, aceites y productos fuertemente alcalinos.  
**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz choco y maíz chala. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**  
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



VERSIÓN 04-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0400

14.5 cm

2 175 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua y salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para esta fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.



# RAYO<sup>®</sup> 500FW

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Atrazine 500 g/L  
Aditivos c.a.p. 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM SAC

**neoagrum**

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 4 L

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Vent.:

Formulado por:  
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD  
64 Riverside Wharf Road, Chengde Town, Hangzhou  
Zhejiang Province  
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazine que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y quito de azúcar. RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS Litro	P.C. (litros)	L.M.R. (litros)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de azúcar	Uchireña	Euphorbia spp	60 - 80	-	0,5
	Herba mora	Solanum nigrum			
	Paja paja o rabo de loro	Setaria verticillata			
Maíz	Verdolaga	Portulaca oleracea	15 - 30	30	0,25
	Yuyo	Amaranthus spp			
	Chamico	Datura stramonium			
	Malgusano	Flaveria bidentis			
Sorgo	Uchireña de galimazo	Chenopodium spp	15 - 30	30	0,25
	Paja de galimazo	Echinochloa sp.			
	Añón seco	Biotis pilosa			

P.C.: Procedo de extracción - L.M.R. Límite máximo de residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosos, maíz chocado y maíz chafa. En campos de maíz perdidos o causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0013

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
 CICOTON: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tome antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague varias veces este envase. Vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego mulchelo bien o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto



# RAYO<sup>®</sup> 500FW

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Atrazina 500 g/L  
 Aditivos c.a.p. 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA  
 Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
 NEOAGRUM SAC



Calle Cantuaritas 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
 Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 4 L  
 N° de Lote:  
 F. de Form.:  
 F. de Venc.:

Formulado por  
 EASTSUN CHEMICAL CO., LTD  
 RM 2407, N° 1, Lane 600, Tianshan Road,  
 Shanghai 200051  
 CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y café de azúcar. RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de azúcar	Lecheros	Euphorbia spp	60 - 80	-	05
	Herba mora	Solanum nigrum			
	Plata pilón o rizo de zorro	Selene verticillata			
Maíz	Vipilón	Portulaca oleracea	15 - 30	30	025
	Vajo	Amaranthus spp			
	Chamusco	Datura stramonium			
	Melapuzano	Flavone bidens			
Sorgo	Hojita de gallinazo	Chenopodium spp	15 - 30	30	025
	Paja de gafina	Elymus indica			
	Ajor seco	Bidens pilosa			

P.C.: Período de carencia. L.M.R.: Límites máximos de residuos.  
**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas e suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados

**PERIODO DE RENEGRO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos

**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas maíz chadío y maíz chafé. En campos de maíz perdidos o causos no controlados se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para las fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ  
 ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0014

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido envasado, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego añada agua tratándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acople autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estancos o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

# RAYO<sup>®</sup> 500FW

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Atrazina 500 g/L  
Aditivos c.a.p. 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM SAC

**neogrum**

Calle Cantuarina 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 4 L  
N° de Lote:  
F. de Form.  
F. de Venc.

Formulado por:  
SINOCHEM NINGBO LTD.  
21 Jiangsu St. Ningbo 315000  
CHINA


NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hojas anchas en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar.  
RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lechera	Euphorbia spp	60-80	-	05
	Hoja mora	Solanum nigrum			
	Paja paja o rizo de zorro	Selama verticillata			
Maíz	Verdolaga	Portulaca oleracea	15-30	30	025
	Yuyo	Amaranthus spp			
	Chenopo	Datura stramonium			
	Melipaguano	Flavaria bidentis			
Sorgo	Hoja de galera	Chenopodium spp	15-30	30	025
	Paja de galera	Echinochloa indica			
	Añojo seco	Bidens pilosa			

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea cubierto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azúcares, aceites y productos fuertemente alcalinos

**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz choclo y maíz chifle. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

VERSIÓN 04-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0300

48 cm

1 cm

1 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarla con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC. 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego utilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto



# RAYO<sup>®</sup> 500FW

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Atrazina 500 g/L  
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEO AGRUM SAC

**neogrum**

Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 4 L  
N° de Lote:  
F. de Form:  
F. de Vent:

Formulado por:  
DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.  
Km 1.5 Vía Duran - Tembo  
ECUADOR

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hojosa en cultivos como maíz, sorgo y café de azúcar.  
RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de azúcar	Lechera	Euphorbia spp	60-80	-	0,5
	Herbimora	Solanum nigrum			
	Paja paja o rabo de zorro	Selena verticillata			
Maíz	Verdugo	Portulaca oleracea	15-30	30	0,25
	Yuyo	Amaranthus spp			
	Chamisa	Datura stramonium			
	Milagrosano	Flaveria bidentis			
Sorgo	Herba de galinazo	Chenopodium spp	15-30	30	0,25
	Pata de gallo	Elettaria indica			
	Amar seco	Bidens pilosa			

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados

**PERÍODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos

**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz chocó y maíz chala. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0010

14,5 cm

2,175 cm

48 cm

1 cm

1 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reensazar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego mulchelo triturándolo o partiéndolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



# RAYO<sup>®</sup> 500FW

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Abrazne ..... 500 g/L  
Aditivos c.a.p ..... 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
**NEOAGRUM SAC**

**neogrum**

Calle Centurrias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 4 L

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Ven:

Formulado por:  
**YANCHENG TAI HE CHEMICALS CO. LTD**  
Chenjiagang Chemical Park, Xiangshui County  
Yancheng, Jiangsu Province - CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y dala de azúcar. RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de azúcar	Lechuga	<i>Euphorbia</i> spp.	60-80	-	0,5
	Hecho mora	<i>Solanum nigrum</i>			
	Paja pepi o rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>			
Maíz	Verdugo	<i>Portulaca oleracea</i>	15-30	30	0,25
	Yuyo	<i>Amaranthus</i> spp.			
	Chenopo	<i>Datura stramonium</i>			
	Malgosano	<i>Flourensia bidentis</i>			
Sorgo	Herba de gamuza	<i>Echinochloa</i> spp.	15-30	30	0,25
	Pala de galera	<i>Echinochloa indica</i>			
	Ahor seco	<i>Bidens pilosa</i>			

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correctamente y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azúcares, aceites y productos fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz choco y maíz chabalo. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que se recomiendan, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



VERSIÓN 04-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0017

14,5 cm

2,175 cm