

48 cm

1 cm

1 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Útilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No remezclar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuere con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No fene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilízalo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para esta fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



# RAYO<sup>®</sup> 500FW

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Atrazina 500 g/L  
Aditivos c.a.p 1 L

Reg. N° 153 - 86 - AG - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM SAC

**neoagrum**

Calle Centurión 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 20 L  
N° de Lote:  
F. de Form.  
F. de Veric.

Formulado por:  
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.  
6th Floor, Gaixinjishuanguye Centre, Shunhua Road  
750M, Jinan, Shandong  
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hojales en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar. RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lechera	Euphorbia spp	60-80	-	05
	Hojas mora	Solenum nigrum			
	Plaga paga o rabo de toro	Sesuvia verticillata			
Maíz	Verdugo	Portulaca oleracea	15-30	30	025
	Yuyo	Amaranthus spp			
	Chamisco	Datura stramonium			
	Milagustano	Flavina bidentis			
Sorgo	Herba de galinazo	Chenopodium spp	15-30	30	025
	Paja de galinzo	Elaeagnus indica			
	Ajor seco	Bidens pilosa			

P.C. Período de estancia L.M.R. Límites máximos de residuos.  
**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo se conecte y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

**PERÍODO DE RENOVACIÓN:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.  
**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz choco y maíz chala. En campos de maíz perdidos o cañales no controlados se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

8018

14.5 cm

2.175 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No fene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego añada solo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.



# RAYO® 500FW

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Atrazina ..... 500 g/L  
Aditivos c.a.p ..... 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEO AGRUM SAC



Calle Cantusillas 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 20 L

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

Formulado por:  
SINOCEM AGRO CO., LTD  
17-19 th Floor, N°33, He Nan Road(S) Shanghai,  
200002  
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar.  
RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lechera	Euphorbia spp	6.0 - 8.0	-	0.5
	Hierba mora	Solanum nigrum			
Maíz	Paja pegajosa o rallo de zorro	Setaria verticillata	15 - 3.0	30	0.25
	Viergeta	Amaranthus spp			
	Yuyo	Datura stramonium			
	Chamiso	Flavone bidentis			
Sorgo	Hierba de galinazo	Chenopodium spp	15 - 3.0	30	0.25
	Paja de galina	Echinochloa indica			
	Ayón seco	Bidens pilosa			

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y los bajos o suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar el campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.  
**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con aplicaciones de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.  
**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz chadío y maíz chala. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**  
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ  
ULTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0019

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y brévese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tome antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice triturándolo o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



# RAYO<sup>®</sup> 500FW

## HERBICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:  
Atrazina 500 g/L  
Aditivos c.a.p. 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM SAC



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 20 L  
N° de Lote  
F. de Form.  
F. de Ven.

Formulado por:  
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO. LTD  
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou  
Zhejiang Province  
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar. RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lophra	Euphorbia spp	60-80	-	05
	Hierba mora	Solanum nigrum			
	Paja paja o rabo de zorro	Setaria verticillata			
Maíz	Verdugo	Portulaca oleracea	15-30	30	0.25
	Yuyo	Amaranthus spp			
	Chenop	Chenopodium spp			
	Maguajano	Flavescens bidentis			
Sorgo	Hierba de galincho	Chenopodium spp	15-30	30	0.25
	Paja de gallina	Echinochloa indica			
	Ahor seco	Bidens pilosa			

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz choclo y maíz chito. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad de el producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0300

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTEX: 0800-1-3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua estada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vacíe la solución en la mezcla de aplicación, luego asíllalo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



# RAYO<sup>®</sup> 500FW

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

COMPOSICIÓN:  
Abrazine 500 g/L  
Aditivos c.a.p. 1 L

Reg. N° 153-98-AG-SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM SAC

**neogrum**

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Formulado por:  
EASTSUN CHEMICAL CO., LTD  
RM 2407 N° 1, Lane 600, Tianshan Road,  
Shanghai 200051  
CHINA

Contenido neto: 20 L  
N° de Lote:  
F. de Farm.  
F. de Venc.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de abrazine que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y café de azúcar.  
RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (fl/m)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Café de azúcar	Lirio	<i>Euphorbia</i> spp	60-80	-	0,5
	Herbaleses	<i>Solanum nigrum</i>			
	Paja paja o rizo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>			
Maíz	Verbasca	<i>Portulaca oleracea</i>	15-30	30	0,25
	Yuyo	<i>Amaranthus</i> spp			
	Chiricaco	<i>Datura stramonium</i>			
	Milgucos	<i>Pilea bidentis</i>			
Sorgo	Malva de guineano	<i>Chenopodium</i> spp	15-30	30	0,25
	Paja de galina	<i>Echinochloa indica</i>			
	Ajón seco	<i>Bidens pilosa</i>			

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo se corra y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azules, aceites y productos fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz chocado y maíz chabalo. En campos de maíz perdidos o casales no controlados se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0021

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lávela con abundante agua y jabón

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX: 0800 - 4 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua estada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilízalo triturándolo o perforándolo y deposítalo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto



# RAYO<sup>®</sup> 500FW

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Atrazina 500 g/L  
Aditivos c.a.p 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - BENASA  
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:  
NECAGRUM SAC

**neocagrum**

Calle Centurión 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Formulado por:  
SINOCEM NINGBO LTD  
21 Jiangsu St. Ningbo 315000  
CHINA

Contenido neto: 20 L  
N° de Lote:  
F. de Form.  
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar. RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lichera	Euphorbia spp	60-80	-	0,5
	Hojita mora	Solanum nigrum			
	Paja pegajosa o rabo de zorro	Setaria verticillata			
Maíz	Verdugo	Pipturus albertonei	15-30	30	0,25
	Yuyo	Amaranthus spp			
	Chamico	Datura stramonium			
	Metagrisano	Flaveria bidentis			
Sorgo	Malva de galinazo	Chenopodium spp	15-30	30	0,25
	Pila de galina	Elysiene indica			
	Aché seco	Bidens pilosa			

P.C. Período de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con aplicaciones de uso común excepto con caldo Bordenax, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos

**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz chichilo y maíz chabato. En campos de maíz perdidos o causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a los rotulados en la etiqueta y que es eficaz para los fines a que se recomienda, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0022

48 cm

1 cm

1 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuere con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua estada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego multiplíquelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.



# RAYO<sup>®</sup> 500FW

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Abrazate 500 g/L  
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
**NEOAGRUM SAC**



Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Formulado por:  
**DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.**  
Km 1,5 Via Durán - Tumbaco  
ECUADOR

Contenido neto: 20 L  
N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de abrazate que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar. RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lechea	Euphorbia spp	60-80	-	05
	Herba mora	Solanum nigrum			
Maíz	Paja pegajosa o rizo de zorro	Setaria verticillata	15-30	30	0,25
	Yumbú	Pipturus nitratus			
	Chamico	Amaranthus spp			
	Malagutano	Flaventa bidentis			
Sorgo	Herba de garza	Chenopodium spp	15-30	30	0,25
	Paja de gallina	Echinochloa indica			
	Ajar seco	Bidens pilosa			

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas o suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación. Es importante que el caldo se conecte y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.  
**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con fungicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.  
**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas: maíz choco y maíz chachi. En campos de maíz perdidos o cesares no controlados se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**  
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0023

14.5 cm

2 175 cm-1

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación evitando la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 817-6400

- Beber abundantemente agua estada para inducir al vómito. No tome antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego mulicarlo (triturándolo o perforándolo) y deposítalo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acapio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Contenido neto: 20 L

Nº de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

# RAYO® 500FW

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Atrazina 500 g/L  
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 153 - 98 - AG - GENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NECAGRUM SAC

**neogrum**

Calle Cantuzales 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 817-6400 / Fax: 817-6401

Formulado por:  
YANCHENG TAI HE CHEMICALS CO. LTD  
Chenjiaqiang Chemical Park, Xianghai County  
Yancheng, Jiangsu Province - CHINA

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar.  
RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lecheros Wichamoras Pulgón o tordo de zorro	Euphorbia spp Solanum nigrum Sesuvium portulacastrum	60 - 80	-	05
Maíz	Verdugo Yuyo Chamico Malgosano	Portulaca oleracea Amaranthus spp Dalium stramonium Flaveria bidentis	15 - 30	30	0,25
Sorgo	Yuyo de galinazo Yuyo de galina Abar seco	Chenopodium spp Eleusine indica Bidentis plicata	15 - 30	30	0,25

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** P.C. Poca de caranca - L.M.R. Límite máximo de residuos.  
RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con alto contenido de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz choclo y maíz chilo. En campos de maíz, pérdidas a causas no controladas se recomiendan volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ  
ULTIMA REVISIÓN: 19-12-12

13000

48 cm

1 cm

1 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.  
En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuere con la piel, lávela con abundante agua y jabón.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 817-6400

Beber abundante agua estada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.  
No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego multiplíquelo triturándolo o perforándolo y deposítalo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acapio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



# RAYO<sup>®</sup> 500FW

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:  
Altrazna: 500 g/L  
Aditivos c.s.p.: 1 L

Reg. N° 153-96-AG-SENASA  
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:  
NEOAGRUM SAC

Calle Cantuzas 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 817-6400 / Fax: 817-6401

Contenido neto: 20 L  
N° de Lote:  
F de Farm:  
F de Vers:

Formulado por:  
MEGHMAN INDUSTRIES LTD  
Block N° 400, 401 & 455 Village Chharod TA  
Sanand Ahmedabad 382170  
India

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hojas anchas en cultivos como maíz, sorgo y soja de azúcar.  
RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	PC (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lechera	Euphorbia spp	60-80	-	0.5
	Hierba mora	Sidaemum nigrum			
	Paja pegosa o rallo de zorro	Setaria verticillata			
Maíz	Verdolaga	Portulaca oleracea	15-30	30	0.25
	Yuyo	Amaranthus spp			
	Clamiro	Datura stramonium			
	Malgosumo	Flavescens badius			
Sorgo	Hierba de galinazo	Chenopodium spp	15-30	30	0.25
	Paja de galinazo	Echinochloa indica			
	Ahorruco	Bidens pilosa			

PC: Período de carencia. L.M.R. Límites máximos de residuos.  
FRECUCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y los bajos a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz chocado y maíz chabalo. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada resutalidad del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



VERSIÓN 04-HZ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0300

14.15 cm

2.175 cm