

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese leve la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tome antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítalo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

RAYO® 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Atrazina 500 g/L
Aditivos c.a.p. 1 L

Reg. N° 153-96-AG-SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC

neogrum

Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 200 L
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por
MEGHMANI INDUSTRIES LTD
Block N° 400, 401 & 455, Village Chharodi TA
Sarand Ahmedabad 382170
India

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar.
RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (diar)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lechera	Euphorbia spp	60-80	-	05
	Hojita mora Plaga negra o rabo de zorro	Solanum nigrum Setaria verticillata			
Maíz	Verdugo	Portulaca oleracea	15-30	30	025
	Vuyo	Amaranthus spp			
	Chamico Milagruano	Datura stramonium Platanus bidentis			
Sorgo	Merba de galinazo	Echinochloa spp	15-30	30	025
	Piñón de gallina	Echinochloa indica			
	Añor soco	Bidens pilosa			

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y los bajos o suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con aplicaciones de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz chocado y maíz chafa. En campos de maíz perdidos o cosechas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ
ULTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0026

14.5 cm

2.175 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuere con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTDX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego enjuague triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.



Contenido neto: 200 L
N° de Lote:
F. de Farm.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

RAYO[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Abrazate: 500 g/L
Aditivos c.a.p.: 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - GENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC

neo agrum

Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Formulado por:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD
6th Floor, Gaocunshuchangyue Centre, Shunhua Road
750#, Jinan, Shandong
CHINA

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hojas anchas en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar.
RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lechera	Euphorbia spp	60-80	-	0,5
	Hoja mora	Solanum nigrum			
	Paja paja o raba de zorro	Selene verticillata			
Maíz	Verdolaga	Portulaca oleracea	15-30	30	0,25
	Vuyo	Amaranthus spp			
	Charasco	Datura stramonium			
	Molaguano	Flourensia bidentis			
Sorgo	Hoja de galinazo	Chenopodium spp	15-30	30	0,25
	Pala de galina	Elymus indica			
	Añor seco	Bidens pilosa			

P.C.: Período de curación L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas o suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correctamente y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz chocado y maíz chaba. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que se recomienda, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

VERSIÓN 04-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

2000

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas
- No atravesar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarlos con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOK: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego añádale litrato o perborato y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

RAYO[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Abrazine 500 g/l
Aditivos c.s.p. 1 l

Reg. N° 153 - 98 - AG - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEO AGRUM SAC

neogram

Calle Cantuarles 370 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SINOCHEM AGRO CO., LTD.
17-19 th Floor, N°33 He Nan Road(S) Shanghai,
200002
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RAYO 500FW es un herbicida a base de abrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja encha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar. RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	lechera	Euphorbia spp	60-80	-	0.5
	hierba mora	Solanum nigrum			
	Paja pegajosa o rabo de toro	Solanum volubile			
Maíz	Verdolaga	Portulaca oleracea	1.5-3.0	30	0.25
	Yuyo	Amaranthus spp			
	Chenopo	Datura stramonium			
	Malgosano	Favaria bidentis			
Sorgo	Hierba de galinazo	Elymus indica	1.5-3.0	30	0.25
	Paja de galina	Bidens pilosa			
	Amar seco				

P.C. Periodo de carencia L.M.R. Límites máximos de residuo
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y los ligeros a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos
FITOTOXICIDAD: Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz chocado y maíz chala. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la probada residualidad del producto

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines y usos recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ
ULTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0028

14.5 cm

2.175 cm

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NED AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua esalada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento embolmático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego multiplique triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estancias o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.



RAYO[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Atrazine 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC



Calle Centuriones 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:
F. de Form.
F. de Venc.

Formulado por
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou
Zhejiang Province
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazine que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar.
RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS Una	P.C. (litros)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	lechera	Euphorbia spp	6.3 - 8.0	-	0.5
	hierbo mora / hoja paja o rabo de zorro	Solanum nigrum / Solanum verticillata			
Maíz	Verdugo	Portulaca oleracea	1.5 - 3.0	30	0.25
	Yuyo Chanco	Amaranthus spp			
	Malgusano	Datura stramonium / Flaveria bidentis			
Sorgo	Hierba de galinazo	Chenopodium spp	1.5 - 3.0	30	0.25
	Pila de gallina / Amor seco	Elymus indica / Bidens pilosa			

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas o suaves ligeras como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldos Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.
FITOTOXICIDAD: Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz chadco y maíz chala. En campos de maíz perdidos o caídos no controlados se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN:19-12-12

0300

14.5 cm

2 175 cm-1

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiase, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarlos con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTEX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua estada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



RAYO[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Atrazina... 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 153 - 06 - AG - SENASA
Titular del Registro, importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC

neogrum

Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 200 L.
N° de Lote:
F. de Farm.:
F. de Venc.:

Formulado por:
EASTSUN CHEMICAL CO., LTD.
RM 2407 N° 1, Lane 600, Tianshan Road,
Shanghai 200251
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas en suelos tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar. RAYO 500FW es eficaz sobre todo por los raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	R.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lechera Hierba mora Raya paja o rabo de zorro	Euphorbia spp Solanum nigrum Setaria verticillata	6.0 - 8.0	-	05
Maíz	Verdelapaja Yuyo Chamiso Malpaccano	Amaranthus spp Amaranthus spp Datura stramonium Flavina bidens	1.5 - 3.0	30	0.25
Sorgo	Herbido de guilacazo Paja de galina Amar seco	Chenopodium spp Eleusine indica Bidens pilosa	1.5 - 3.0	30	0.25

PC: Período de cosecha. L.M.R.: Límites máximos de residuos.
FRECUCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas o suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con fungicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz chocado y maíz chala. En campos de maíz perdidos o cosechas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ
ULTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0030

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 817-6400

- Beber abundantemente agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego multiplíquelo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para esta fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



RAYO[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Atrazina 500 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:
NEOAGRUM SAC

neogrump

Calle Cantavieja 270 Ct. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 200 L
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SINOCEM NINGBO LTD.
21 Jiangxia St. Ningbo 315000
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar. RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Uchirra	Euphorbia spp	60 - 80	-	0,5
	Hierba mora	Solanum nigrum			
	Paja paja o rabo de zorro	Scleria verticillata			
Maíz	Mordeliga	Portulaca aliracea	15 - 30	30	0,25
	Yuyo	Amaranthus spp			
	Cherico	Datura stramonium			
	Mitaguasano	Flavens bifloris			
Sorgo	Hierba de gallineta	Chenopodium spp	15 - 30	30	0,25
	Pata de gallina	Eleusine indica			
	Amar seco	Bidens pilosa			

P.C. Período de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos
FRECÜENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y los bajos a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con aplicaciones de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.
FITOTOXICIDAD: Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz chocado y maíz chata. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

VERSIÓN 04-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

10091

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 817-8400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego multiplíquelo triplumando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.



RAYO[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Atrazine: 500 g/L
Aditivos c.a.p.: 1 L

Reg. N° 153 - 98 - AG - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC

neo agrum

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 817-8400 / Fax: 817-8401

Contenido neto: 200 L
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por
DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.
Km 1,5 Vía Durán - Tarma,
ECUADOR

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hojas anchas en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar.
RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (litros)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	lechera	Euphorbia spp	60-80	-	05
	hierba mora	Solanum nigrum			
	flora paja o rabo de zorro	Setaria verticillata			
Maíz	verdolaga	Portulaca oleracea	15-30	30	025
	chicaco	Amaranthus spp			
	chicaco	Datura stramonium			
	Mutaguasano	Flaveria bidentis			
Sorgo	hierba de garabito	Echinochloa spp	15-30	30	025
	pala de gallina	Elyusine indica			
	amir seco	Bidens pilosa			

P.C. Periodo de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados

PERIODO DE RENEGREDO: No reingresar el campo antes de 24 horas de realizada la aplicación

COMPATIBILIDAD: Es compatible con fungicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz choco y maíz chato. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0032

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NED AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deséchelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



Contenido neto: 200 L
N.º de Lote:
F. de Form.:
F. de Venç:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

RAYO[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Atrazina 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N.º 153 - 96 - AG - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEDAGRUM SAC

nedagrum

Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Formulado por:
YANCHENG TAI HE CHEMICALS CO. LTD
Chenpang Chemical Park, Xiangshui County
Yancheng, Jiangsu Province - CHINA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar.
RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lechera	Euphorbia spp	60 - 80	-	0,5
	Hierba mora	Solanum nigrum			
Maíz	Paja paja o rabo de zorro	Setaria verticillata	15 - 30	30	0,25
	Urdzuga	Portulaca oleracea			
	Wayo	Amaranthus spp			
	Chamico	Datura stramonium			
Sorgo	Matagusanó	Flavescens bidentis	15 - 30	30	0,25
	Hierba de garraza	Chenopodium spp			
	Hierba galina	Elymus indica			
	Ajar seco	Bidens pilosa			

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con abonos de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz choco y maíz chala. En campos de maíz perdidos o controlados se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN 04-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 19-12-12

0030

14.5 cm

2.175 cm