

28 cm

Herbiamina

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

2,4-D sal amina..... 720 g/L

1,2- Benzisothiazolin-3-one..... 0.01g/L

Aditivos csp 1 L

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular del Registro:
SHARDA PERU SAC
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068,
Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 614-1500
Fax: 614-1517

FARMAGRO   
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulado por:

SWATI CHLORIDES PRIVATE LIMITED
Admn. Office: 603, Siddharth Complex, R.C. Dutt Road,
Alkapuri, Vadodara- 390 007 Gujarat, India.
Telefono: + 91 - 265 - 3059846/3206676/3206549
Fax: + 91-265-2342201

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en un lugar seco, fresco y ventilado. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas y forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Alquilclorofenoxi

- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua durante mínimo 20 minutos.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica, no suministrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente durante un mínimo de 20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lente de contacto si los hubiera y seguir enjuagando.
- En caso de inhalación: retirar al paciente a una zona ventilada. Aplicar respiración artificial si fuera necesario.

ANTIDOTO: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 08001-3040 (gratuito) / 328-7398
Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)
ESSALUD: 0801-10200 CISPQUIM: 0800-50847



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en el mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- El producto no debe aplicarse con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

HERBIAMINA es un herbicida hormonal sistémico, selectivo y post-emergente. Estas características permiten a HERBIAMINA moverse dentro de toda la planta y ocasionar un descontrolado desarrollo de la maleza, cuyos síntomas son la hipertrofia y la deformación de estas. HERBIAMINA por su alta selectividad sólo afecta a malezas de hoja ancha en cultivos anuales y perennes.

No usar el producto en suelos arenosos ni en zonas con napa freática superficial.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ha	(días)	(ppm)
Caña de azúcar	"Amor seco" "Capuli" "Chamico" "Hierba mora" "Verdolaga" "Lechera" "Yuyo" "Higuenilla"	<i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra physaloides</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Euphorbia heterophylla</i> <i>Amaranthus gracilis</i> <i>Ricinus communis</i>	3 - 4	137 - 214	0.05

L.M.R.: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar HERBIAMINA (i.a. 2,4-D SalAmina) máximo 1 aplicación/campaña/año. Las aplicaciones de HERBIAMINA se realizan sobre malezas anuales y perennes de hoja ancha cuando estas hayan emergido.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

HERBIAMINA es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, incompatible con sustancias alcalinas y sustancias de reducción.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta, siguiendo las instrucciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

15 cm

