

1 cm para sellar

Lannafarm[®] 90 PS

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP


COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente activo: Methomyl 900 g/kg
Ingredientes inertes: 100 g/kg

Reg. PQUA N° 116-SENASA

R.U.C. N° 20100180210

VENTA CON PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO



TITULAR DE REGISTRO:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto MzA6 Lote 15 - La Molina. Lima, Perú
Teléfono: 348-1018 / Telefax: 346-9609

Fabricante:

Point Agro-China Ltd

Wan Shi, Yixing,
Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y Distribuido por:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos-Lima, PERÚ
Teléfono: 614-1500 Fax: 614-1517

FARMAGRO S/A   

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

® Marca registrada por FARMAGRO S.A.

Contenido: 1Kg



**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

1 cm para sellar

 Banda - Pantone 199 C
 Marca - Pantone Red 032 C
 Pantone 7481 C

 Letras FARMAGRO-Pantone Coll Gray 11C
 Cuadro hombre- Pantone 2995 C
 Cuadro vaca - Pantone 164 C
 Cuadro planta - 7487 C

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón. Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario. Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No aplicar el producto en suelos con napa freática superficial. Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

INDICATIVOS DE USO

LANNAFARM 90PS es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

USO ESPECIFICO DEL PRODUCTO

CULTIVOS	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Técnico	Común	Kg/Ha	g/cil		
Tomate	<i>Spodoptera eridania</i>	Gusano del fruto	0.4	200	7	1
Maíz	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	0.5 - 0.6	250-300	7	0.1
Espárrago	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	1	2
Espárrago	<i>Spodoptera eridania</i>	Gusano cogollero	0.4	200	1	2
Espárrago	<i>Copitarsia turbata</i>	Copitarsia	0.4	200	1	2
Espárrago	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	0.4	200	1	2
Pimiento	<i>Symmetrischema casicicum</i>	Gusano del fruto	0.4	200	3	1
Pimiento	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	3	1
Pimiento	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Spodoptera	0.4	200	3	1
Cebolla	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	0.4 - 0.6	200-300	7	0.2
Alcachofa	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	0.4	200	N.d	0.2
Alcachofa	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	N.d	0.2
Sandía	<i>Diaphania nitidalis</i>	Perforador de guía	0.4 - 0.6	200-300	3	0.2
Patlo	<i>Fiorinia fioriniae</i>	Fiorinia	-	200	1	0.05
Patlo	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	-	200	1	2
Patlo	<i>Dagbertus minensis</i>	Chinche del patlo	-	200	1	2
Col	<i>Plutella xylostella</i>	Gusano de hoja	0.4 - 0.6	200-300	3	0.05
Alfalfa	<i>Prodenia eridania</i>	Gusano ejército	-	200	7	10
Naranja	<i>Lepidosaphes beckii</i>	Queresa coma	-	200-300	3	1

P.C. = Período de carencia. L.M.R. = Límite Máximo de Residuos.
N.d. = No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: LANNAFARM 90 PS es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

FITOTOXICIDAD: LANNAFARM 90 PS no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

