

TEMPANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Imidacloprid	228 g/Kg
Lambda-cyhalothrin	100 g/Kg
Aditivos	c.s.p 1Kg

Reg. PQUA N° 737-SENASA

Titular del registro: Hortus S.A. Calle Sucre N°270, Ate. Lima - Perú

Formulado y Envasado por:



Almirante Pastene 300, Providencia
Santiago, Chile
Tel: 562-24706800 - Fax: 562-24869100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima - Perú
Teléfono: 717-9040 Fax: 718-8684
RUC: 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto : 1 Kg

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si se inhala. Evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado en lugar fresco y seco
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoides + Piretroides
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: no provocar vómito, no dar nada a una persona inconsciente, trasladar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada. Lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al paciente de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos: enjuagar los ojos con abundante agua limpia y fresca por 15 minutos, si la irritación persiste consulta al médico.
- En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consultar al médico
- Teléfonos de emergencia:
 - ° CICOTOX: 0800-13040 ó 328-7398
 - ° CIPROSQUIM: 0800-50847
 - ° ESSALUD: 117
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MANEJO PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Aplicar por las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación de 5 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados para este fin y evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TEMPANO es un insecticida sistémico, de contacto e ingestión, de amplio espectro de acción, indicado especialmente para el control de cogollero en el cultivo de maíz.

Sistemas de preparación y aplicación: realice un humedecimiento adecuado para lograr una buena cobertura y efectividad del insecticida. Para preparar la solución, se deberá llenar el tanque de agua a la mitad. Luego agregar la cantidad necesaria de **TEMPANO** manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego completar el tanque hasta el nivel deseado. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”
CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		P.C (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/200L)	(Kg/ha)		
Maíz	“Cogollero”	<i>Spodoptera frugiperda</i>		0,20	21	0,05 (1) 0,02 (2)
Arroz	“Mosca Minadora”	<i>Hydrellia wirthi</i>	0,25 a 0.3		30	0,02 (1) 1,5 (2)

LMR: Límite máximo de residuos en ppm P.C.: Período de carencia

(1) Lambda-cyhalothrin

(2) Imidacloprid

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 1 aplicación por campaña, cuando se observa la presencia de la plaga en el cultivo.

En el cultivo de arroz, realizar máximo (1) aplicación por campaña / año, a un volumen máximo de agua de 200L/Ha. En caso requiera de otra aplicación, rotar con otro plaguicida de modo de acción diferente.

PERÍODO DE REINGRESO:

24 horas para reingreso al campo tratado.

COMPATIBILIDAD:

TEMPANO es compatible con productos fuertemente alcalinos, pH mayor a 11, y con productos fuertemente ácidos, pH inferior a 4.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

