

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 "MANTENGASE BIJO LA Llave FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- No fumar ni beber alcohol durante la aplicación.
- No aplicar ni fumar con simultaneidad con alimentos, medicinas, bebidas, ni ferreje.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o llave al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel lavarlos con abundante agua y jabón.
- No se debe beber nada ni inhalar el vapor a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No se debe aplicar en áreas expuestas. Sign tratamiento sintomático.

**CICLOTOL: 0800 - 1 - 3040**      **NEGAGRUM SAC 817-4400**  
**CSPROQUIM: 0800-90-847**      **ALOGSALUD: 0901-10200 (Gratuito)**

**MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS Y ENVASES VACIOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego muldado triturado o perforado y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Demuestre el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:**

- Pedigoso para las plantas de agua con los rindes de la aplicación o sobras del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligoso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar la contaminación de las aguas subterráneas por infiltración.
- Utilizar una banda de protección hacia fuentes de agua no menor a 3 metros.



# SELLADOR 400 EC

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICION:**

Puntomedida: ..... 400 g/L  
 Aditivo: ..... c.s.p. 1 L

Título del Registro Agrícola otorgado por:  
**Reg. PQUA N° 146 - SEMASA**  
**NEGAGRUM S.A.C.**



Calle Chulpana 270 Of. 101 - Miraflores - Lima  
 Teléfono: 817-4400 Fax: 817-4401

**Contenido neto: 4 L**

**Fórmula por N° de Llave:** .....  
**F. de Perm.:** .....  
**F. de Vert.:** .....

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
 SELLADOR 400 EC es un herbicida selectivo que puede ser absorbido por raíces y hojas. Actúa inhibiendo la división celular durante la etapa de los meristemas de tallos y raíces. Su uso es recomendado para el control de las malezas que se encuentran en el período de crecimiento vegetativo de cultivos de pastos, forrajes, huertos, etc. en presencia de las malezas. Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de aplicación mecánica o equipos accionados por tractor.  
 Preparación de la mezcla: Llene el tanque o cilindro hasta un tercio de sus capacidad con agua, agregue la dosis recomendada de SELLADOR 400 EC y complete con agua agitando constantemente hasta lograr una emulsión.  
 \*CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO\*

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	MALEZAS		Dosis	Lbs	P.C. (kg)	L.M.E. (g/m)
	Nombre común	Nombre Técnico				
Arroz	Verdegas	Pantano agraria	1.5	3.0	60	0.25
	Yuyo mora	Sesuvium portulacastrum				
Café de azúcar	Verdegas	Manzanillo agraria	1.25	2.5	60	0.1
	Yuyo mora	Manzanillo agraria				
	Verdegas	Manzanillo agraria				
	Yuyo mora	Manzanillo agraria				
Cebolla	Verdegas	Manzanillo agraria	2.0	4.0	60	0.1
	Yuyo mora	Manzanillo agraria				
Espinaca	Verdegas	Manzanillo agraria	-	-	-	-
	Yuyo mora	Manzanillo agraria				

P.C.: Porcentaje de cobertura. L.M.E.: Litros necesarios de riego.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:** En cultivos de siembra directa aplicar SELLADOR 400 EC inmediatamente después de la siembra. En cultivos de transplante aplicar SELLADOR 400 EC en pre-emergente. Reducir rindes una aplicación.

**PERIODO DE RENDIMIENTO:** No cosechar el campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPARIBILIDAD:** Es compatible con los fungicidas de uso reciente excepto con aquellos de rindes azules.

**FITOTOXICIDAD SELLADOR 400 EC:** El título del Registro garantiza que los concentrados tipo-concentrado del producto cumplen con los requisitos establecidos en la ley que es el que debe ser el que se debe para el uso del producto, en sus rindes de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.