Muscardin®

Beauveria bassiana

INSECTICIDA BIOLÓGICO AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Beauveria bassiana :	1 x10^{8} esporas/g
Aditivos:	cps 1 kg.

Reg.PBUA Nº 265 - SENASA

FABRICANTE:
BIOECOLOGICOS LTDA
Diagonal 4 N° 12-43 Pueblo Viejo Sopo (Cundinamarca). Col

TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: -

INNOVAK PERU

INNOVAK PERÚ S.A.C.
Jr. Aurelio Miro Quesada Nº 508. San Martin de Porres - Lima 31
www.innovakglobal.com

CONTENIDO NETO: 1 kg.

LOTE No.

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

® Marca Registrada por INNOVAK PERU

LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- Usar elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (guantes, overol, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).
- No coma, beba, ni fume durante la mezcla y aplicación.
- No ingiera el producto y evite elo contacto con la piel, ojos y la inhalación de la aspersión.
- Al termino de la aplicación cambiar la ropa. Lavese con abundante agua y jabón.
- Debe guardarse en su empaque original etiquetado y cerrado en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y animales .
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas ni forrajes.
- Transportar y almacenar el producto en lugares frescos y secos a temperatura menor a 30ºC y no exponer a luz directa del sol.
- Una vez abierto aplicar inmediatamente.
- Evitese la contaminación de fuentes de agua, caños, rios, lagunas, etc. así como cultivos vecinos con sobrantes de producto o aguas de lavado.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.

PRIMEROS AUXILIOS. CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua limpia durante 10 a 15 minutos

CONTACTO CON LA PIEL: retirar los vestigios contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos. INHALACIÓN: Respirar aire fresco. INGESTIÓN: No induzca el vomito, busque asistencia medica y muestre esta etiqueta

.

ANTIDOTO Y NOTAS AL MEDICO: No hay antídoto específico, tratar sintomáticamente.

DL 50 del producto formulado
Aguda oral > 2000 mg/kg. de peso
Aguda Dermal >2000 mg/kg. de peso

Teléfono de emergencia :
Central de Urgencia de EsSalud: 117 (linea gratuita)
CICOTOX 0800-1-3040(linea gratuita)

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

FORMA DE USO: MUSCARDIN® actúa por contacto en el insecto. Por lo que las aplicación debe hacerse dirigida hacia donde se ubica la plaga y hacia las áreas de desplazamiento de esta. Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:
Momento de aplicación: **MUSCARDIN®** debe aplicarse siempre al inicio de la infestación, a la aparición de primeros estadios de la plaga. Para aplicaciones mas tardías, aumente la dosis y la frecuencia de aplicación teniendo siempre en cuenta que la plaga debe estar expuesta al contacto con el producto. Antes de aplicar el producto asegúrese que no se encuentren residuos de otros productos en los tanques de mezcla, ni en las mangueras de aplicación, para lo cual se recomienda lavarlos por lo menos 4 veces con abundante agua.
Preparación de la mezcla de aplicación: Se recomienda mezclarlo con aceite agrícola (80cc), haciendo primero una premezcla y luego disolver en el tanque. Después agite vigorosamente la mezcla y complete el volumen de agua a emplear en la aplicación. Después de realizar la mezcla con agua se debe aplicar el producto en el menor tiempo posible. Si el volumen de la mezcla es muy grande y toma varias horas, agite la mezcla periódicamente.

Compatibilidad: Puede ser usado en programas de agricultura orgánica, manejo integrado de cultivos MIC, rotación con otros plaguicidas. El producto no debe ser mezclado con fungicidas, productos químicos o coadyuvantes que alteren el rango de pH entre 6-7.5. En cualquier mezcla debe probarse previamente su compatibilidad.
Fitotoxicidad: MUSCARDIN® no es fitotóxico, ni fitopatógeno.

Recomendaciones de Uso

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS g/Cil.200L	P.C (dias)	L.M.R (p.p.m)
	Común	Tecnico			
Esparrago	Barrenador de brotes	*Prodiplosis longifila*	500	n.r	n.r

n.r. = No requiere. P.C: Periodo de carencia . L.M.R.= Limite máxima de residuo .

NOTA AL COMPRADOR:
INNOVAK PERU garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de empleo.

LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCION

"Mantengase alejado de las personas,animales, productos alimenticios y medicinales"

"Destruya este envase inmediatamente después de usar el producto"