

RadiGrow®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Citoquininas	g/L
Auxina	0.022
Fosforo Bioactivado (P ₂ O ₅)	0.55
Ácidos Carboxy	16.5
expresados como Carbono Orgánico Oxidable	55.0

Reg. P.BUA N° 264 - SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:
DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A. C.
Jr. Niquel N° 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

Formulado por:

Innovak
GLOBAL

Productos Químicos de Chihuahua S.A. de C.V.
Blvd Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México
CP. 31375
Tel y Fax (614) 436-0138

CONTENIDO NETO: 1L

LOTE No.

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Marca Registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCION

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES DE ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- Usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Atención: la aplicación cambiará de ropa y bañarse.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está consciente.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- Antídoto
- No existe antídoto específico. Tratamiento es sintomático

Teléfono de emergencia: ALO ESSALUD 0801-10200 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizado, inutilizando o perforándolo y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobranes del producto o envases vacíos.
- Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
RADIGROW®. Es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascarillas agrícolas ECCA Carboxy con un adecuado balance hormonal y nutricional que incrementa la proporción de frutificación cosechable. Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.

Modo de aplicación: RADIGROW, es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento

Preparación de la mezcla de aplicación: Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desentorseque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para mezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El número máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: RADIGROW no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para las fines aquí recomendadas si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	RECOMENDACION	POSIS L/CH/200L	P.C. (días)	L.M.R. (p-pm)
Plátano	Aplicar el producto al inicio de floración, amarre y llenado de fruto.	2-3	N.A.	N.A.

N.A. = No Aplica. P.C. = Período de carencia (días). L.M.R. = Límite máximo de residuo en partes por millón

