MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RadiGrow®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:	**g/L**
Citoquininas	0.022
Auxina	0.55
Fosforo Bioactivado (P_2O_5)	16.5
*Ácidos Carboxy *expresados como Carbono Orgánico Oxidable*	55.0

Reg.PBUA Nº 264 - SENASA

Titular del registro:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr. Niquel Nº 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AgroKlinge
Av. Separadora Industriel Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

FORMULADO POR:

Innovak GLOBAL
Innovak Global S.A. de C.V.
Blvd Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México
CP. 31375
Telf.: y Fax (614) 436-0138
www.innovakglobal.com

CONTENIDO NETO: 1L
LOTE No.
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:

® Marca Registrada

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES DE ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado cerrado.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Evitar e contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra,botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Al termino de la aplicación cambiar de ropa y bañarse.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente esta consciente.
- En caso de inhalación, trasladar al efectuada a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

Antidoto
No existe antidoto especifico. Tratamiento es sintomático
Teléfono de emergencia: Alo ESSALUD 0801-10200 (linea gratuita),

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturandolo o perforandolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propositelo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacios.
- Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RADIGROW**, Es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascarillas agrícola ECCA Carboxy con un adecuado balance hormonal y nutricional que incrementa la proporción de fruta cosechable . Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.
- **Modo de aplicación: RADIGROW,** es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento
- **Preparación de la mezcla de aplicación**: Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	RECOMENDACION	DOSIS L/Cil.200L	P.C (dias)	L.M.R (p.p.m)
Pimiento	Aplicar el producto al inicio de floración, amarre y llenado de fruto.	2 - 3	N.A.	N.A.

N.A.. = No Aplica. P.C: Periodo de carencia (dias) . L.M.R.= Límite máxima de residuo en partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El numero máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: RADRIGOW no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características física química del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendadas si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCION

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RadiGrow®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:	**g/L**
Citoquininas	0.022
Auxina	0.55
Fosforo Bioactivado (P_2O_5)	16.5
*Ácidos Carboxy *expresados como Carbono Orgánico Oxidable*	55.0

Reg.PBUA Nº 264 - SENASA

Titular del registro:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr. Niquel Nº 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AgroKlinge
Av. Separadora Industriel Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

FORMULADO POR:

Innovak GLOBAL
Innovak Global S.A. de C.V.
Blvd Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México
CP. 31375
Telf.: y Fax (614) 436-0138
www.innovakglobal.com

CONTENIDO NETO: 10L
LOTE No.
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:

® Marca Registrada

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES DE ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado cerrado.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Evitar e contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra,botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Al termino de la aplicación cambiar de ropa y bañarse.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente esta consciente.
- En caso de inhalación, trasladar al efectuada a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

Antidoto
No existe antidoto especifico. Tratamiento es sintomático
Teléfono de emergencia: Alo ESSALUD 0801-10200 (linea gratuita),

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturandolo o perforandolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propositelo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacios.
- Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RADIGROW**, Es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascarillas agrícola ECCA Carboxy con un adecuado balance hormonal y nutricional que incrementa la proporción de fruta cosechable . Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.
- **Modo de aplicación: RADIGROW,** es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento
- **Preparación de la mezcla de aplicación**: Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	RECOMENDACION	DOSIS L/CIL200L	P.C (dias)	L.M.R (p.p.m)
Pimiento	Aplicar el producto al inicio de floración, amarre y llenado de fruto.	2 - 3	N.A.	N.A.

N.A.. = No Aplica. P.C: Periodo de carencia (dias) . L.M.R.= Límite máxima de residuo en partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El numero máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: RADRIGOW no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características física química del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendadas si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCION

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RadiGrow®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:	**g/L**
Citoquininas	0.022
Auxina	0.55
Fosforo Bioactivado (P_2O_5)	16.5
*Ácidos Carboxy *expresados como Carbono Orgánico Oxidable*	55.0

Reg.PBUA Nº 264 - SENASA

Titular del registro:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr. Niquel Nº 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AgroKlinge
Av. Separadora Industriel Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

FORMULADO POR:

Innovak GLOBAL
Innovak Global S.A. de C.V.
Blvd Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México
CP. 31375
Telf.: y Fax (614) 436-0138
www.innovakglobal.com

CONTENIDO NETO: 100L
LOTE No.
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:

® Marca Registrada

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES DE ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado cerrado.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Evitar e contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra,botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Al termino de la aplicación cambiar de ropa y bañarse.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente esta consciente.
- En caso de inhalación, trasladar al efectuada a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

Antidoto
No existe antidoto especifico. Tratamiento es sintomático
Teléfono de emergencia: Alo ESSALUD 0801-10200 (linea gratuita),

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturandolo o perforandolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propositelo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RADIGROW**, Es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascarillas agrícola ECCA Carboxy con un adecuado balance hormonal y nutricional que incrementa la proporción de fruta cosechable . Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.
- **Modo de aplicación: RADIGROW,** es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento
- **Preparación de la mezcla de aplicación**: Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	RECOMENDACION	DOSIS L/CIL200L	P.C (días)	L.M.R (p.p.m)
Pimiento	Aplicar el producto al inicio de floración, amarre y llenado de fruto.	2 - 3	N.A.	N.A.

N.A.. = No Aplica. P.C: Periodo de carencia (días) . L.M.R.= Límite máxima de residuo en partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El numero máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: RADRIGOW no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características física química del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendadas si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCION

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RadiGrow®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:	**g/L**
Citoquininas	0.022
Auxina	0.55
Fosforo Bioactivado (P_2O_5)	16.5
*Ácidos Carboxy *expresados como Carbono Orgánico Oxidable*	55.0

Reg.PBUA Nº 264 - SENASA

Titular del registro:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr. Niquel Nº 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AgroKlinge

Av. Separadora Industriel Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

FORMULADO POR:

Innovak GLOBAL

Innovak Global S.A. de C.V.
Blvd Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México
CP. 31375
Telf.: y Fax (614) 436-0138
www.innovakglobal.com

CONTENIDO NETO: 200L
LOTE No.
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:

® Marca Registrada

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES DE ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado cerrado.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Evitar e contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra,botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Al termino de la aplicación cambiar de ropa y bañarse.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente esta consciente.
- En caso de inhalación, trasladar al efectuada a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

Antidoto
No existe antidoto especifico. Tratamiento es sintomático
Teléfono de emergencia: Alo ESSALUD 0801-10200 (linea gratuita),

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturandolo o perforandolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propositelo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacios.
- Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RADIGROW**, Es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascarillas agrícola ECCA Carboxy con un adecuado balance hormonal y nutricional que incrementa la proporción de fruta cosechable . Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.
- **Modo de aplicación: RADIGROW,** es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento
- **Preparación de la mezcla de aplicación**: Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	RECOMENDACION	DOSIS L/Cil.200L	P.C (dias)	L.M.R (p.p.m)
Pimiento	Aplicar el producto al inicio de floración, amarre y llenado de fruto.	2 - 3	N.A.	N.A.

N.A.. = No Aplica. P.C: Periodo de carencia (dias). L.M.R.= Límite máxima de residuo en partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El numero máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: RADRIGOW no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las caracteristicas fisica química del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendadas si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCION

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RadiGrow®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:	**g/L**
Citoquininas	0.022
Auxina	0.55
Fosforo Bioactivado (P_2O_5)	16.5
*Ácidos Carboxy *expresados como Carbono Orgánico Oxidable*	55.0

Reg.PBUA Nº 264 - SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr. Niquel Nº 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

FORMULADO POR:

Innovak Global S.A. de C.V.
Blvd Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México
CP. 31375
Telf.: y Fax (614) 436-0138
www.innovakglobal.com

CONTENIDO NETO: 1L
LOTE No.
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:

® Marca Registrada

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES DE ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado cerrado.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Evitar e contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra,botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Al termino de la aplicación cambiar de ropa y bañarse.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente esta consciente.
- En caso de inhalación, trasladar al efectuada a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

Antidoto
No existe antidoto especifico. Tratamiento es sintomático
Teléfono de emergencia: Alo ESSALUD 0801-10200 (linea gratuita),

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturandolo o perforandolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propositelo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacios.
- Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RADIGROW**, Es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascarillas agrícola ECCA Carboxy con un adecuado balance hormonal y nutricional que incrementa la proporción de fruta cosechable . Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.
- **Modo de aplicación: RADIGROW,** es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento
- **Preparación de la mezcla de aplicación**: Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	RECOMENDACION	DOSIS L/CIL200L	P.C (días)	L.M.R (p.p.m)
Pimiento	Aplicar el producto al inicio de floración, amarre y llenado de fruto.	2 - 3	N.A.	N.A.

N.A.. = No Aplica. P.C: Periodo de carencia (días) . L.M.R.= Límite máxima de residuo en partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El numero máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: RADRIGOW no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las caracteristicas fisica química del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendadas si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCION

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RadiGrow®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:	**g/L**
Citoquininas	0.022
Auxina	0.55
Fosforo Bioactivado (P_2O_5)	16.5
*Ácidos Carboxy *expresados como Carbono Orgánico Oxidable*	55.0

Reg.PBUA Nº 264 - SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr. Niquel Nº 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

FORMULADO POR:

Innovak Global S.A. de C.V.
Blvd Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México
CP. 31375
Telf.: y Fax (614) 436-0138
www.innovakglobal.com

CONTENIDO NETO: 10L
LOTE No.
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:

® Marca Registrada

PRECAUCION

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES DE ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado cerrado.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Evitar e contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra,botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Al termino de la aplicación cambiar de ropa y bañarse.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente esta consciente.
- En caso de inhalación, trasladar al efectuada a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

Antidoto
No existe antidoto especifico. Tratamiento es sintomático
Teléfono de emergencia: Alo ESSALUD 0801-10200 (linea gratuita),

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturandolo o perforandolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propositelo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacios.
- Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RADIGROW**, Es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascarillas agrícola ECCA Carboxy con un adecuado balance hormonal y nutricional que incrementa la proporción de fruta cosechable . Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.
- **Modo de aplicación: RADIGROW,** es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento
- **Preparación de la mezcla de aplicación**: Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	RECOMENDACION	DOSIS L/CIL200L	P.C (días)	L.M.R (p.p.m)
Pimiento	Aplicar el producto al inicio de floración, amarre y llenado de fruto.	2 - 3	N.A.	N.A.

N.A.. = No Aplica. P.C: Periodo de carencia (días) . L.M.R.= Límite máxima de residuo en partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El numero máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: RADRIGOW no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las caracteristicas fisica química del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendadas si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RadiGrow®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:	**g/L**
Citoquininas	0.022
Auxina	0.55
Fosforo Bioactivado (P_2O_5)	16.5
*Ácidos Carboxy *expresados como Carbono Orgánico Oxidable*	55.0

Reg.PBUA Nº 264 - SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr. Niquel Nº 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

FORMULADO POR:

Innovak Global S.A. de C.V.
Blvd Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México
CP. 31375
Telf.: y Fax (614) 436-0138
www.innovakglobal.com

CONTENIDO NETO: 100 L
LOTE No.
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:

® Marca Registrada

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES DE ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado cerrado.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Evitar e contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra,botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Al termino de la aplicación cambiar de ropa y bañarse.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente esta consciente.
- En caso de inhalación, trasladar al efectuada a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

Antidoto
No existe antidoto especifico. Tratamiento es sintomático
Teléfono de emergencia: Alo ESSALUD 0801-10200 (linea gratuita),

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturandolo o perforandolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propositelo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacios.
- Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RADIGROW**, Es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascarillas agrícola ECCA Carboxy con un adecuado balance hormonal y nutricional que incrementa la proporción de fruta cosechable . Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.
- **Modo de aplicación: RADIGROW,** es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento
- **Preparación de la mezcla de aplicación**: Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	RECOMENDACION	DOSIS L/Cil.200L	P.C (dias)	L.M.R (p.p.m)
Pimiento	Aplicar el producto al inicio de floración, amarre y llenado de fruto.	2 - 3	N.A.	N.A.

N.A.. = No Aplica. P.C: Periodo de carencia (días). L.M.R.= Límite máxima de residuo en partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El numero máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: RADRIGOW no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las caracteristicas fisica química del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendadas si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCION

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RadiGrow®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:	**g/L**
Citoquininas	0.022
Auxina	0.55
Fosforo Bioactivado (P_2O_5)	16.5
*Ácidos Carboxy *expresados como Carbono Orgánico Oxidable*	55.0

Reg.PBUA Nº 264 - SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr. Niquel Nº 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

FORMULADO POR:

Innovak Global S.A. de C.V.
Blvd Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México
CP. 31375
Telf.: y Fax (614) 436-0138
www.innovakglobal.com

CONTENIDO NETO: 200 L
LOTE No.
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:

® Marca Registrada

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES DE ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado cerrado.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Evitar e contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra,botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Al termino de la aplicación cambiar de ropa y bañarse.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente esta consciente.
- En caso de inhalación, trasladar al efectuada a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

Antidoto
No existe antidoto especifico. Tratamiento es sintomático
Teléfono de emergencia: Alo ESSALUD 0801-10200 (linea gratuita),

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturandolo o perforandolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propositelo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacios.
- Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RADIGROW**, Es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascarillas agrícola ECCA Carboxy con un adecuado balance hormonal y nutricional que incrementa la proporción de fruta cosechable . Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.
- **Modo de aplicación: RADIGROW,** es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento
- **Preparación de la mezcla de aplicación**: Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	RECOMENDACION	DOSIS L/Cil.200L	P.C (dias)	L.M.R (p.p.m)
Pimiento	Aplicar el producto al inicio de floración, amarre y llenado de fruto.	2 - 3	N.A.	N.A.

N.A.. = No Aplica. P.C: Periodo de carencia (días) . L.M.R.= Límite máxima de residuo en partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El numero máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: RADRIGOW no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las caracteristicas fisica química del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendadas si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCION