

RadiGrow®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Citoquininas	g/L
Auxina	0.022
Fosforo Bioactivado (P ₂ O ₅)	0.55
Ácidos Carboxy	16.5
expresados como Carbono Orgánico Oxidable	55.0

Reg.PBUA N° 264 - SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:
DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr. Niquel N° 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

Formulado por:

INNOVAK
GLOBAL

Productos Químicos de Chihuahua S.A. de C.V.
Blvd Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México
CP. 31375
Tel y Fax (614) 436-0138

CONTENIDO NETO: 10 L

LOTE No.

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Marca Registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCION

A LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES DE ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cambieselo, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- Usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Al término de la aplicación cambiar de ropa y bañarse.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está consciente.
- En caso de inhalación, trasladar al electuado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- Antídoto
- No existe antídoto específico. Tratamiento es sintomático

Teléfono de emergencia: Alo ESSALUD 0801-10200 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, inutilizando o perforándolo y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobranes del producto o envases vacíos.
- Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio designado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
RADIGROW® Es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascanillas agrícolas ECCA Carboxy con un adecuado balance hormonal y nutricional que incrementa la proporción de fruta cosechable. Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.

Modo de aplicación: RADIGROW® es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento.

Preparación de la mezcla de aplicación: Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desatorosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El número máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: RADIGROW no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	RECOMENDACION	POSIS LCH.200L	P.C (dias)	L.M.R (g.p.m)
Pimiento	Aplicar el producto al inicio de floración, amarre y llenado de fruto.	2-3	N.A.	N.A.

N.A. = No Aplica. P.C: Periodo de carencia (dias). L.M.R = Límite máximo de residuo en partes por millón

