

RadiGrow®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:	g/L
Citoquininas	0.022
Auxina	0.55
Fosforo Bioactivado (P ₂ O ₅)	16.5
*Ácidos Carboxy expresados como Carbono Orgánico Oxidable	55.0

Reg.PBUA N° 264 - SENASA

Titular del registro:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.

Jr. Niquel N° 282, Urb. Infantas
Los Olivos, - Lima 39

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



Av. Separadora Industrial M2, "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate, Lima-Perú.
Telf. 612-6565, R.U.C N° 20508704217

FORMULADO POR:



Productos Químicos de Chihuahua S.A. de C.V.
Ejida Vicente Lombardo Toldado #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México
CP 31375
Telf. y Fax (614) 436-0138
www.innovakglobal.com

CONTENIDO NETO: 10 L

LOTE NO.

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Marca Registrada

PRECAUCION

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES DE ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- Usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Al terminar de la aplicación cambiar de ropa y bañarse.
- No almacenar el transportador conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente está consciente.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quítense las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

Antídoto

No existe antídoto específico. Tratamiento es sintomático

Teléfono de emergencia: Ato ESSALUD 0801-10200 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y depositado en los sitios designados por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
RADIGROW® Es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascanilla agrícola ECCA Carboxy con un adecuado balance hormonal y nutricional que incrementa la proporción de frutales cosechables. Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.

Modo de aplicación: RADIGROW, es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento

Preparación de la mezcla de aplicación: Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desentorse la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El número máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: RADIGROW no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	RECOMENDACION	DOSES L/CHL/200L	P.C. (días)	L.M.R. (g-p/m)
Pimiento	Aplicar el producto al inicio de floración, amane y llenado de fruto.	2-3	N.A.	N.A.

N.A. = No Aplica. P.C. Período de carencia (días) L.M.R. = Límite máxima de residuo en partes por millón

