

RadiGrow

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:	g/L
Citoquininas	0.022
Auxina	0.55
Fósforo Bioactivado (P_2O_5)	16.5
*Ácidos Carboxy® expresados como Carbono Orgánico Oxidable	55.0

Reg. PBUA N° 264 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y
DISTRIBUIDOR:



DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr. El Niquel N° 282 Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

FORMULADO POR:



Productos Químicos de Chihuahua, S.A. de C.V.
Bld. Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México CP. 31375
Telf. y Fax (614) 436-0138
www.innovakglobal.com

CONTENIDO NETO: 10 L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

Lote No.

Fecha Formulación:

Fecha Vencimiento:

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Evitar el contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
 - Usar elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).
 - Al término de la aplicación cambiar de ropa y bañarse.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
 - El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- ### PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente está conciente.
 - En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
 - En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia: Alo ESSALUD 0801-10200 (línea gratuita), CICOTEX 0800-13040 (línea gratuita).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RADIGROW®. Es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascarrillas agrícolas **ECCA Carboxy®** con un adecuado balance hormonal y nutricional que incrementa la proporción de fruta cosechable. Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.

MODO DE APLICACIÓN:

RADIGROW®, es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA DE APLICACIÓN:

Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desensrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

CULTIVO	RECOMENDACIÓN	DOSIS mL/L Cil. 200L	P.C (días)	L.M.R (p.p.m)
Pimiento	Aplicar el producto al inicio de floración, amarre y llenado de fruto.	2 - 3	N.A	N.A

N.A. = No aplica P.C: Periodo de carencia(días) L.M.R.= Límite máximo de residuo en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA DE ÉPOCA Y APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El número máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: RADIGROW® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

