# RadiGrow

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA**

## CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

| **COMPOSICIÓN:** | **g/L** |
|---|---|
| Citoquininas | 0.022 |
| Auxina | 0.55 |
| Fósforo Bioactivado ($P_2O_5$) | 16.5 |
| *Ácidos Carboxy® expresados como Carbono Orgánico Oxidable | 55.0 |

**Reg. PBUA N° 264 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**
**DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.**
Jr. El Niquel Nº. 282 Urb.Infantas
Los Olivos - Lima 39

**Lote No.**

**Fecha Formulación:**

**Fecha Vencimiento:**

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

AgroKlinge

**AGRO KLINGE S.A.**
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate. Lima, Perú.
Telf.: 612-6565 R.U.C. N° 20508704217

***FORMULADO POR:***

INNOVAK GLOBAL®

**Productos Químicos de Chihuahua, S.A. de C.V.**
Blvd. Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México CP. 31375
Telf. y Fax (614) 436-0138
**www.innovakglobal.com**

**CONTENIDO NETO: 10 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

# PRECAUCIÓN

# “LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

## “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:**
• No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
• Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
• Evitar el contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
• Usar elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos “ligeramente tóxicos” (overol, guantes, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).
• Al término de la aplicación cambiar de ropa y bañarse.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
• Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
• El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
• Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**
• En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente está conciente.
• En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
• En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
**Antidoto:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**Teléfono de emergencia: Alo ESSALUD 0801-10200 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita).**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**RADIGROW®**, Es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascarillas agrícolas **ECCA Carboxy®** con un adecuado balance hormonal y nutricional que incrementa la proporción de fruta cosechable . Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia.

**MODO DE APLICACIÓN:**
**RADIGROW®**, es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA DE APLICACIÓN:**
Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

| CULTIVO | RECOMENDACIÓN | DOSIS mL/ Cil. 200L | P.C (días) | L.M.R (p.p.m) |
|---|---|---|---|---|
| Pimiento | Aplicar el producto al inicio de floración, amarre y llenado de fruto. | 2 - 3 | N.A | N.A |

N.A. = No aplica P.C: Periodo de carencia(dias) L.M.R.= Límite máximo de residuo en partes por millón (ppm)

**FRECUENCIA DE ÉPOCA Y APLICACIÓN:**
Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El número máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** Reingresar al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

**FITOTOXICIDAD: RADIGROW®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.