

Longitud Total 28.90 cm.

Longitud de Color 28.00 cm.

Longitud Lateral 27.00 cm.

09 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Evite el contacto con los ojos, la piel, puede causar irritación. Dañino si es ingerido.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a radiación solar.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura, hasta el momento de la aplicación.

Instrucciones de Primeros Auxilios

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con abundante agua y suministre un alcali debil (bicarbonato de sodio). No inducir al vomito si el paciente está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Buscar atención médica si persiste irritación.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado inmediatamente. Proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario. Antídoto: no existe antídoto específico. Tratar según síntomas. Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, Desarrollo Tecnico Vegetal S.A.C.: 544-4397

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. No permita animales en las zonas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Citoquininas.....	2.36 g/L
Giberelina	0.0354 g/L
Auxina	0.0354 g/L
Aditivos.....	c.s.p 1L

Reg.PBUA N° 263 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
 Jr. Niquel N° 282, Urb. Infantas
 Los Olivos - Lima 39

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AgroKlinge
 a member of ADAMA
AGROKLINGE S.A.
 Av. El Derby 254 OF903 Santiago de Surco.
 Lima | Tel.: (01)641-0000 / RUC No
 20508704217 | WWW.agroklinge.com.pe

FORMULADO POR:

Innovak
GLOBAL
INNOVAK GLOBAL S.A. de C.V.
 Blvd Vicente Lombardo Toledano #6615
 Col. Concordia Chihuahua, Chih. México
 CP. 31375
 Telf.: y Fax (614) 436-0138
 www.innovakglobal.com

Contenido neto: 1 L.

N° Lote:

F. Formulación:

F. Venc.:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

-**FRUIT XL®**, proviene de extractos concentrados de cascarillas agrícolas; los Acidos ECCA Carboxy® de tipo aromáticos de su formulación, en combinación con un adecuado balance hormonal y nutricional, incrementa la cantidad de brotes productivos, el cuajado, el tamaño y la proporción de frutos de calidad selecta y de alto valor económico.

-**Modo y mecanismo de acción:** bioestimula la síntesis de fosfoinositidos, intensificando la señalización de las citoquininas. FRUIT XL® esta diseñado para aplicarse por aspersión foliar con el volumen de agua suficiente para asegurar buen cubrimiento

-**Modo de empleo:** Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en una cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

Para aspersiones sobre follaje o frutos, deben de usarse boquillas de baja descarga, alta nebulización (muy pequeño tamaño de gota) y alta turbulencia. Para optimizar su desempeño, se recomienda aplicarlo en cultivos con buen estado hídrico y nutricional.

Consultar a un Ingeniero Agronomo

CULTIVO	RECOMENDACIÓN	DOSIS			
		mL/200L	L/ Ha	P.C (días)	L.M.R (p.p.m)
Pimiento	Aplicar el producto al inicio de floracion, amarre y llenado de fruto.	200 - 300		N.A.	N.A.
Vid	Aplicar cuando las bayas tengan de 14 - 16 mm de diametro		0.75 - 1.0	N.A.	N.A.
Palto	Aplicar el producto al inicio de las etapas de floracion, cuajado y antes de caída fisiologica		1.0	N.A.	N.A.
Arandano	Después de poda, brotación, desarrollo vegetativo, pre-floracion, floracion y cosecha		1.0 - 2.0		N.A.
Papa	Aplicar al 80% de la emergencia, al inicio de la tuberizacion y 15 días despues de la tuberizacion	250		N.A.	N.A.
Piña	Aplicar a los 8, 55 y 62 días después de la inducción floral.	250		N.A.	N.A.

N.A. = No aplica P.C: Periodo de carencia(días) L.M.R.= Limite máxima de residuo en partes por millon (ppm).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: FRUIT XL puede ser aplicado en cualquier etapa del cultivo. En los cultivos de pimiento, palto, papa y piña realizar 3 aplicaciones por campaña (1 campaña/año). En el cultivo de vid realizar una aplicación por campaña (1 campaña/año) y en el cultivo de arándano realizar 6 aplicaciones por campana (1 campaña/año).

PERIODO DE REINGRESO: Regresar al área tratada después de 12 horas de aplicación.
COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan calcio; sin embargo, siempre realice una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envases, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCION



ETIQUETAS PARVARIAS EXCLUSIVO SENASA