

# FORTE<sup>®</sup>

## 50 PM

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

## POLVO MOJABLE (WP)

#### COMPOSICIÓN:

Iprodione..... 500 g/kg  
Aditivos c.s.p..... 1kg

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Titular del Registro: <b>NEO AG SAC</b><br>Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima<br>Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401<br>Importado y distribuido por: <b>NEO AG SAC</b><br>Formulado por: <b>SINOCHEM AGRO CO., LTD</b><br>17-19 th Floor. N°33. He Nan Road(s) Shanghai, 200002 P.R.<br>CHINA | <b>Reg. PQUA N°: 187 - SENASA</b><br>N° de Lote :<br>F. de Form. :<br>F. de Venc. : |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

##### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Es moderadamente irritante a los ojos y a la piel
- Ligeramente peligroso por ingestión. Evite respirar la aspersión.
- Ligeramente irritante a las vías respiratorias
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar ni utilizar el envase vacío para almacenar alimentos o agua de consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

##### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Dicarboximide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos consultar al médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM S.A.C.: 617-6400

- **Antídoto:** No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de soporte

##### MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

##### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE :

- Peligroso para los animales acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con capas freáticas superficiales
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

##### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**FORTE 50 PM** es un fungicida de contacto y sistémico localizado con acción protectora y curativa.

**FORTE 50 PM** actúa inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento micelial. Es utilizado para el control de diversos hongos fitopatógenos que atacan a la mayoría de cultivos.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

##### CUADRO DE USOS:

| CULTIVO   | PLAGA            |                             | DOSIS      |         | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|------------------|-----------------------------|------------|---------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común     | Nombre Técnico              | kg / 200 L | kg / ha |                |                 |
| Alcachofa | Moho gris        | <i>Botrytis cinerea</i>     | 0.25       | 0.5     | 14             | 0.02            |
| Arroz     | Rizoctoniasis    | <i>Rhizoctonia oryzae</i>   | 0.3 - 0.35 | --      | 58             | 10              |
| Cebolla   | Pudrición blanda | <i>Sclerotium cepivorum</i> | 0.5        | 1.5     | 7              | 0.2             |
| Mandarina | Moho gris        | <i>Botrytis cinerea</i>     | 0.3        | 1.5     | 14             | 1.0             |
| Pallo     | Moho gris        | <i>Botrytis cinerea</i>     | 0.25       | --      | 14             | 0.02            |
| Pimiento  | Moho gris        | <i>Botrytis cinerea</i>     | 0.5        | 1.0     | 3              | 5               |
| Vid       | Moho gris        | <i>Botrytis cinerea</i>     | 0.3        | --      | 7              | 10              |

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

##### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7-10 días cuando la condiciones sean favorables al desarrollo del patógeno y cada 14 días cuando las condiciones climáticas no sean favorables para la enfermedad.

Realizar máximo 3 aplicaciones / campaña

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **FORTE 50 PM** es compatible con los plaguicidas de uso frecuente con excepción de los de reacción fuertemente alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** **FORTE 50 PM** no es fitotóxico para los cultivos recomendados

##### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**Contenido neto: 10 kg**

## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

