FORTE® 50 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p..... 1kg

Titular del Registro: **NEO AG SAC**
Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401
Importado y distribuido por: **NEO AG SAC**
Formulado por: **SINOCHEM NINGBO. LTD**
21 Jiangxia St. Ningbo 315000.
CHINA

Reg. PQUA N°: 187 - SENASA
Nº de Lote :
F. de Form. :
F. de Venc. :

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
- Es moderadamente irritante a los ojos y a la piel
- Ligeramente peligroso por ingestión. Evite respirar la aspersión.
- Ligeramente irritante a las vías respiratorias
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar ni utilizar el envase vacío para almacenar alimentos o agua de consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo Dicarboximide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos consultar al médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM S.A.C.: 617-6400

- **Antídoto:** No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de soporte

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE :
- Peligroso para los animales acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con capas freáticas superficiales
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
FORTE 50 PM es un fungicida de contacto y sistémico localizado con acción protectora y curativa.
FORTE 50 PM actúa inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento micelial. Es utilizado para el control de diversos hongos fitopatógenos que atacan a la mayoría de cultivos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg / 200 L	kg / ha	(días)	(ppm)
Alcachofa	Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.25	0.5	14	0.02
Arroz	Rizoctoniasis	*Rhizoctonia oryzae*	0.3 - 0.35	--	58	10
Cebolla	Pudrición blanda	*Sclerotium cepivorum*	0.5	1.5	7	0.2
Mandarina	Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.3	1.5	14	1.0
Palto	Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.25	--	14	0.02
Pimiento	Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.5	1.0	3	5
Vid	Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.3	--	7	10

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas farorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7-10 días cuando la condiciones sean favorables al desarrollo del patógeno y cada 14 días cuando las condiciones climáticas no sean favorables para la enfermedad.
Realizar máximo 3 aplicaciones /campaña

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: FORTE 50 PM es compatible con los plaguicidas de uso frecuente con excepción de los de reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD: FORTE 50 PM no es fitotóxico para los cultivos recomendados

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Contenido neto: 10 kg

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO