20.7 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.2

0.9 ± 0.2

7.7 ± 0.3 cm

1.2 cm

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No debe transportarse con productos de consumo humano.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar ó depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- **Grupo Quimíco: Neonicotenoide.**
- En caso de intoxicación por ingestión inmediatamente lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos. llevar al paciente al medico especialista oftalmólogo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEOAGRUM SAC: 617-6400
- Nota al médico: No tiene antidoto especifico. Tratamiento sintomatico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase,vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase."
- "Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado."

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para los organismos acuaticos, no contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envasese vacios.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

CONTROLLER® 350 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid ..... 350 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 185 - SENASA
Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 250 mL
Nº de Lote:
F. de Form.: "ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town,
Hangzhou. Zhejiang Province - CHINA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
CONTROLLER 350 SC es un insecticida sistémico y residual con actividad por contacto e ingestión, es absorbido fácilmente por vía radicular y foliar, distribuido acropetalmente.
CONTROLLER 350 SC es utilizado para el control efectivo, mediante aplicaciones foliares, contra diversas plagas insectiles: Prodiplosis y Mosca Blanca en diferentes cultivos presentando un buen efecto residual después de su aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	L /200 L	L/ha	(días)	(ppm)
Cebolla	Trips	*Thrips tabaci*	0.15	--	5	0.1
Espárrago	Mosca blanca	*Bemisia argentifolii*	0.1 - 0.15	0.2 - 0.3	7	0.05
	Prodiplosis	*Prodiplosis longifila*	0.375 - 0.5	0.75 - 1.0	7	0.05
Mandarina	Mosca blanca lanuda de los cítricos	*Aleurothrixus floccosus*	0.1	--	30	1
Papa	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	0.15 - 0.2	--	21	0.4
Pimiento	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	0.15	0.3	7	1
Tomate	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	0.15	0.3	3	0.5
Vid	Filoxera	*Viteus vitifoliae*	0.10 - 0.15	0.5 - 0.75	30	1

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO