

7.7 cm

0.7 cm

21.0 cm

0.5 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto puede ser mortal si se ingiere (DL50 oral en ratas: 422 mg/kg pc.).
- Este producto es peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Este producto causa daño temporal a los ojos, utilice protección ocular.
- Evite cualquier contacto de gestantes con este producto.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con personas, animales, alimentos, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, overol, botas de goma, gafas y respirador con filtros para solventes orgánicos) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 08001 - 3040 CROP BUSINESS SAC: 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



VERTIPLUS 18 EC

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Abamectin18 g/L

Aditivosc.s.p. 1 L



Reg. PQUA N° 755 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.
Importado y distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.

Contenido neto: 250 ml

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:
SHANGHAI-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23 Lane 5398, Shentuan Road,
Songjiang District - Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

VERTIPLUS 18 EC es un insecticida-acaricida que actúa por contacto e ingestión, además tiene actividad traslaminar sistémica localizada en la planta.

VERTIPLUS 18 EC actúa sobre todos los estados larvales que minan dentro de la hoja, manifiesta efecto secundario en hembras adultas al esterilizarlas, afectando la oviposición.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/ha		
Mandarina	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.1	0.5	7	0.01
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.2	0.4	14	0.01
Vid	Acaro	<i>Colomerus vitis</i>	0.2	-	28	0.01

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: El momento oportuno de aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo. Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña/año para mandarina y 4 aplicaciones por año (2 aplicaciones por campaña) para el cultivo de papa.

No se debe aplicar VERTIPLUS 18 EC en cultivos y plantas durante la floración, ya que es tóxico para las abejas.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: VERTIPLUS 18 EC no es fitotóxico si se usa a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



1.20 cm