

7.7 cm

0.7 cm

21.0 cm

0.5 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto puede ser mortal si se ingiere (DL50 oral en ratas: 422 mg/kg pc.).
- Este producto es peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Evite cualquier contacto de gestantes con este producto.

PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 08001 - 3040 CROP BUSINESS SAC: 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas u artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos.



VERTIPLUS 18 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Abamectin 18 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 755 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización

Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA

Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 250 ml

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD

30/F, Golden Center Tower N° 3037

Jintian Road CBD Futian, Shenzhen

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

VERTIPLUS 18 EC es un insecticida-acaricida que actúa por contacto e ingestión, además tiene actividad traslaminar sistémica localizada en la planta. VERTIPLUS 18 EC actúa sobre todos los estados larvales que minan dentro de la hoja, manifiesta efecto secundario en hembras adultas al esterilizarlas, afectando la oviposición.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Mandarina	"Ácaro del tostado"	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.1	0.5	7	0.01
Papa	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.2	0.4	14	0.01
Vid	"Ácaro"	<i>Colomerus vitis</i>	0.2	-	28	0.01

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: El momento oportuno de aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo. Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña/año para mandarina y 4 aplicaciones por año (2 aplicaciones por campaña) para el cultivo de papa. No se debe aplicar VERTIPLUS 18 EC en cultivos y plantas durante la floración, ya que es tóxico para las abejas

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



1.20 cm