

SCAPE® 73

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Benalaxil 80 g/kg
Mancozeb 650 g/kg
ETU 0.38 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 186 - SENASA



Título de Registro:

NEOAGRUM S.A.C.
Pj. Camino de Acceso N° 02 -
Urb. Parcelación Calamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú.
Teléfono: 617-6400

Importado y distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 - Miraflores, Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Contenido neto: 25 kg

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:

SERFI S.A.
Km 9.5 Carretera Central
Ate Vitarte

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Causa irritación moderada a los ojos
- Ligeramente irritante a la piel
- Su uso continuo causa alergias a la piel, es sensibilizante
- Es ligeramente irritante por inhalación
- Tóxico por ingestión
- No aplicar por personas embarazadas
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico Fenilamidas: Benalaxil
- Grupo químico Ditiocarbamatos: Mancozeb
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lávela con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación cutánea y de las mucosas: lavados, pomadas oftálmicas, inhalaciones de camomila y tratamientos genéricos de la dermatitis.
- Contraindicaciones: Alcohol, aceites y grasas.
- No dar de beber nada a un paciente en estado inconsciente.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEOAGRUM SAC: 617-6400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SCAPE 73 es un fungicida de doble acción. Por su acción sistémica llega y protege todos los órganos de las plantas (yemas, hojas y tallos herbáceos). Su acción de contacto, inhibe el desarrollo del hongo en la superficie de los órganos de la planta.

Llene hasta la mitad el cilindro o tanque con agua y vierta la dosis recomendada de SCAPE 73, agítelo, complete el agua y vuelvase a agitar.

Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimento, previa calibración de los equipos de aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar las aplicaciones ante la presencia de condiciones ambientales favorables para el desarrollo del hongo o de los primeros síntomas de la enfermedad en los cultivos. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña para los cultivos objetivos

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

SCAPE 73 es compatible con los insecticidas, fungicidas, y acaricidas de uso común, no mezclar con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No existen evidencias fitotóxicas de SCAPE 73 para los usos propuestos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg / 200 L	P.C. días	L.M.R. ppm
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Cabolla	Midiu	Peronospora destructor	0.5 - 0.6	28	0.2
Lechuga	Midiu	Bremia lactucae	0.4	28	0.5
Papa	Hielo o rancho	Phytophthora infestans	1.0	28	0.02
Pimiento	Pudrición radicular	Phytophthora capsici	0.5	15	0.05
Tomate	Hielo o rancho	Phytophthora infestans	0.5 - 0.6	28	0.5

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

