

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- El producto es nocivo por ingestión.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo Químico: Neonicotinoide**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- No existe antidoto específico. Siga tratamiento sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para abejas y otros artrópodos beneficios
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.



# GLADIADOR®

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**COMPOSICIÓN:**

Acetamiprid ..... 200 g/L  
Aditivos ..... 800 g/L

Reg. PQUA N° 133 - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEO AG SAC

Calle Melitón Porras 392, Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 250 ml

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Fabricado y Formulado por:  
SINOHEM AGRO CO., LTD.  
17-19 th Floor, N°33, He Nan Road(s)  
Shanghai, 200002 P.R. CHINA



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

GLADIADOR es un insecticida sistémico traslaminar, de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión.

GLADIADOR es utilizado para el control de insectos chupadores masticadores tales como: Mosquilla de los brotes, Arrebiatado, etc.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO   | PLAGAS                  |                                 | DOSIS     |         | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|-----------|---------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común            | Nombre Técnico                  | mL/200 L  | L/ha    |                |                 |
| Algodón   | Arrebiatado             | <i>Dysdercus peruvianus</i>     | 200-300   | 0.4-0.6 | 7              | 0.05            |
| Cebolla   | Trips                   | <i>Thrips tabaci</i>            | 100-150   | -       | 7              | 0.02            |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes | <i>Prodiplosis longifila</i>    | 200-300   | 0.4-0.6 | 7              | 0.05            |
| Frijol    | Mosca blanca            | <i>Bemisia tabaci</i>           | 100-150   | -       | 7              | 0.4             |
| Pimiento  | Prodiplosis             | <i>Prodiplosis longifila</i>    | 150       | 0.3     | 1              | 0.1             |
| Tomate    | Mosca blanca            | <i>Trialeurodes vaporarum</i>   | 150       | 0.3     | 7              | 0.1             |
| Vid       | Piojo harinoso          | <i>Pseudococcus longispinus</i> | 100 - 150 | —       | 3              | 0.35            |

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Iniciar el tratamiento, previos monitoreos del campo de cultivo, considerando el grado de infestación de la plaga. Realizar como máximo de 3 aplicaciones por campaña para los cultivos mencionados.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

