

PROYECTO DE ETIQUETA – Presentación 1 L

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, guardar en un lugar fresco y seco.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: estrobilurinas y triazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Teléfonos de emergencia: ESSALUD en línea (opción 4) 0801-10200 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), Telef. Farmex (01) 630-6400.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo cortándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

METEOR

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA- SC

Composición Química:

Azoxystrobin..... 200 g/L
Tebuconazol 125 g/L
Aditivos c.s.p... 1.0 L

Reg. N°

Titular del Registro:
FARMEX S.A.

Contenido Neto:
1 Litro

Fabricado y formulado por:
Ningbo Synagrochem Co. Ltd.
No. 757 Room 1801, Rili Middle Road,
Ningbo 315199. China



Importado y distribuido por:
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7
San Isidro, Lima-Perú. Teléfono: 630-6400.

N° de Lote :

Fecha de Fabricación :

Fecha de Vencimiento:

**NO
CORROSIVO**

**NO
INFLAMABLE**

**NO
EXPLOSIVO**

GENERALIDADES:

METEOR es un fungicida con actividad protectante, curativa, erradicante, translaminar y sistémico que se recomienda en campos de *Capsicum annuum* para el control de la oidiosis *Leveillula taurica*. METEOR inhibe la germinación de la espora, inhibe el crecimiento micelar y muestra una actividad antiesporulante, además actúa sobre la membrana protoplásmica, inhibiendo la síntesis de esteroides lo cual causa pérdidas de los constituyentes citoplásmicos esenciales.

METEOR se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados. Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

CUADRO DE USOS: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad		Dosis (mL/cil)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
<i>Capsicum annuum</i>	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	200	3	0,05

PC: período de carencia. LMR: límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN. Aplicar a la presencia de los primeros síntomas, en zonas endémicas aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar 2 aplicaciones por campaña. Intervalo de aplicación de 14 días, con una campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO. No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado el ganado durante este periodo.

COMPATIBILIDAD. Es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

FITOTOXICIDAD. METEOR no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL. El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO

- DAÑINO -

