

HOJA INFORMATIVA_RETIRA 24 CM X 6 CM

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a una zona ventilada. Permitir que una persona entrenada brinde respiración artificial si lo caso necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESCALUD: 117
CICOTOL: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESechos Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el producto, enjuagarse tres veces y volver la solución en el envase de aplicación y luego lavarlo minuciosamente o por lavado y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Después el envase debe llevarse al centro de acopio.
- No se debe obligatoriamente el tipo basado del presente envase.



MEASURES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Almacenar en lugares para los organismos a colación.
- No contaminar ríos, arroyos o arroyos con los desechos de este tipo de residuos.
- No utilizar en la zona de aplicación de agua con los restos de aplicación o excedentes del producto.
- Después de la aplicación, lavar los recipientes con agua de al menos 5 veces.
- No aplicar en áreas domésticas, zonas y áreas de cultivo. No permitir animales en el área de aplicación.
- El producto no debe aplicarse en zonas con aguas frías, superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recolectado inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su liberación hacia aguas subterráneas.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

CHOPALAN® 50 SC es un fungicida sistémico que es absorbido a través de las hojas y raíces y se mueve en forma xilemática (movimiento ascendente). Presenta propiedades protectivas y curativas sobre diversas enfermedades.

CHOPALAN® 50 SC se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o la parte de su capacidad. Luego se agrega la cantidad reducida de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

CHOPALAN® 50 SC puede ser aplicado con pulverizadores manuales de potencia mecánica, motorizada o eléctrica, equipos de aplicación manual o mecánica. Los jales en donde se aplican deben estar en buen estado y ser cubiertos antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUANTO DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS mg/200L (l/ha)	P.C. L/HA. (l/ha)
	Membreza Común	Membreza Clavellada		
Abundancia	Borolls	Borolls cruenta	200-250	7
Med	Borolls	Borolls cruenta	400-500	3

PC: Porcentaje de curación.
L/ha: Litros de producto por hectárea.

FRECUENCIA Y FORMA DE APLICACIÓN

Realizar la aplicación al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar dos (2) aplicaciones de CHOPALAN® 50 SC como máximo al año, considerando un intervalo de 15 días entre aplicaciones.

PERÍODO DE RESISTENCIA

Después de la aplicación, se debe evitar la recolección de la cosecha durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CHOPALAN® 50 SC es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, e incompatible con sales fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.

Se recomienda antes de aplicar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

FITOTOXICIDAD

CHOPALAN® 50 SC no es fitotóxico cuando se usa a la dosis y calidades recomendadas en la presente etiqueta.

RESPUESTA BIOLÓGICA CIVIL

El estudio de registro garantiza que las características fitoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para las fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.