

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm
Actualizado: Junio 2015
ML

PANTONE YELLOW C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Cuidado, evita el contacto. Puede causar dermatitis.
- Almacenar el producto bajo llave, en ambiente fresco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación y para ingresar a áreas tratadas en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazole.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antidoto. Tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos los párpados y lavar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a una zona ventilada. Permitir que una persona entrenada brinde respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESCALUD: 117

CICOTON: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego huallecho triturando o perforando y deposítela en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Deposite el envase vacío lavado al centro de acopio.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Almacenar solamente para los organismos acuáticos.
- No contaminar por escape o con fugas con los insectos o animales vecino.
- No contaminar las fuentes de agua con los insectos de aplicación o sobran del producto.
- Reemplazar una bandeja de no aplicación hasta cuando el agua de al menos 5 metros.
- Prepara para animales, domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con aguas frías superficiales o en aguas altamente permeables.
- En caso de derame, el producto debe ser recogido inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su liberación hacia aguas subterráneas.



croplan[®] 50 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Carbendazim..... 500 g/L
Aditivos..... CSP 1L

Reg. PQUA N° 528 - SENASA

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:



WILLIAMS & LINTAS
17 Floor, Seaview Plaza,
No.283- Shau Kei Wan Road,
Hong Kong.

Importado y Distribuido por:

MONTANA S.A.
Av. Los Rosales 280,
Santa Anita, Lima - Perú.
Teléfonos: (511) 4193000
E-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 1L

Lote N°

Fecha de Fab:

Fecha de Exp:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



INDICACIONES DE USO Y MANEJO

CROPLAN 50 SC es un fungicida sistémico que es absorbido a través de las hojas y raíces y se mueve en forma sapoplasmática (movimiento ascendente), presenta propiedades protectoras y curativas sobre diversas enfermedades.

CROPLAN 50 SC se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe lavar el tanque de aplicación hasta la mitad o 1/4 partes de su capacidad. Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

CROPLAN 50 SC puede ser aplicado con pulverizadores manuales de polvora (tracheal), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractor. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS ml/200L	PC (Dosis)	L.M.R. (ppm)
	Nuevas Cuscuta	Nuevas Cuscuta			
Alfalfa	Borrís	Borrís	200-250	7	0.7
Vid	Borrís	Borrís	400-500	7	3

PC: Puntos de Cuscuta
Una línea sistemática de fusión

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar la aplicación al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda realizar dos (02) aplicaciones de CROPLAN 50 SC como máximo al año, considerando un intervalo de 10 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

No regresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CROPLAN 50 SC es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común e incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.

Se recomienda antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

FOTOLICUIDAD

CROPLAN 50 SC no es fotolítico, usado a la dosis y cultura recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fitosanitarias del producto contenido en esta etiqueta corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, y se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.