

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm
DICIEMBRE DEL 2024
AG

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Cuidado, evite el contacto. Posible carcinógeno.
- Almacenar el producto bajo llave, en ambiente fresco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazole.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto. Tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Permitir que una persona entrenada brinde respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
GENAGRO S.A: (01) 419-3030

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

croplan® **50 SC**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Carbendazim.....500 g/L
 Aditivos.....csp 1L

Reg. PQA N° 528 – SENASA

Titular de Registro:
GENAGRO S.A.

Formulado por:
 WILLOWOOD

Willowood Limited
 17 Floor, Seaview Plaza,
 No.283- Shau Kei Wan Road,
 Hong Kong.

Importado y distribuido por:
GENAGRO S.A.
 Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofi. 401
 La Molina. Lima - Perú.
 Teléfonos: (511) 4193030
 E-mail: info@genagro.com.pe

Contenido Neto: 1L

Lote N°:
 Fecha de Form.:
 Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CROPLAN® 50 SC es un fungicida sistémico que es absorbido a través de las hojas y raíces y se mueve en forma acropétala (movimiento ascendente). Presenta propiedades protectantes y curativas sobre diversas enfermedades.

CROPLAN® 50 SC se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

CROPLAN® 50 SC puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarína	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	200-250	7	0,7
Vid	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	400-500	7	3

PC: Periodo de Carenia
 LMR: Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar la aplicación al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda realizar dos (02) aplicaciones de **CROPLAN® 50 SC** como máximo al año, considerando un intervalo de 10 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CROPLAN® 50 SC es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común e incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes. Se recomienda antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.

FITOTOXICIDAD

CROPLAN® 50 SC no es fitotóxico usado a la dosis y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

