

# CASCABEL 90PS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

**COMPOSICIÓN:**

Methomyl ..... 900 g/kg  
Aditivos.....c.s.p..1 kg

Reg. PQUA N°130-SENASA

VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO



**TITULAR DE REGISTRO:**

**POINT ANDINA S.A.**


Calle Loreto MZA6 Lote15- La Molina. Lima, Perú

Teléfono: 348-1018

**FORMULADO POR:**

**POINT INTERNATIONAL LTD.**

42 St. Margarets Grove,  
Twickenham TW1 1 JG, United Kingdom  
Tel. (44 - 20) 8892 3862



**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
**POINT ANDINA S.A**

**CONTENIDO NETO: 1 Kg.**

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO**

Marca ● Pantone 7455 C

Banda ● Pantone 199 C

Logo Point ● Pantone 7481 C

Logo PIAGGIO

● Pantone 136 C

● Pantone 7462 C

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Carbamato**

En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.

Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

**Teléfonos de emergencia:**

CICOTOX: 0800-1-3040.  
ESSALUD: 0801-10200 ó 107  
CISPROQUIM: 0800-5-0847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No utilizar este envase para conservar alimentos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
- No aplicar el producto en suelos con napa freática superficial.
- Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**CASCABEL 90 PS** es un insecticida en polvo del grupo de los carbamatos que actúa por contacto e ingestión. Es un insecticida de amplio espectro de acción, que altera las funciones neurofisiológicas de los insectos. Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

**USO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO**

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVOS  | NOMBRE DE LA PLAGA             |                      | DOSIS     |         | P.C.<br>(Días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|--------------------------------|----------------------|-----------|---------|----------------|-----------------|
|           | Técnico                        | Común                | Kg/Ha     | G/cil   |                |                 |
| Tomate    | <i>Spodoptera eridania</i>     | Gusano del fruto     | 0.4       | 200     | 7              | 1               |
| Maíz      | <i>Spodoptera frugiperda</i>   | Cogollero            | 0.5-0.6   | 250-300 | 7              | 0.1             |
| Espárrago | <i>Heliothis virescens</i>     | Barrenador de brotes | 0.4       | 200     | 1              | 2               |
| Pimiento  | <i>Symmetrischema capsicum</i> | Gusano del fruto     | 0.4       | 200     | 3              | 1               |
| Pimiento  | <i>Heliothis virescens</i>     | Barrenador de brotes | 0.4       | 200     | 3              | 1               |
| Cebolla   | <i>Thrips tabaci</i>           | Trips                | 0.4 - 0.6 | 200-300 | 7              | 0.2             |
| Alcachofa | <i>Heliothis virescens</i>     | Barrenador de brotes | 0.4       | 200     | N.d            | 0.2             |

P.C. = Período de carencia. L.M.R. = Límite máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación

**COMPATIBILIDAD:**

**CASCABEL 90 PS** es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre

**FITOTOXICIDAD:**

**CASCABEL 90 PS** no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones dadas.

