

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# ITAZOLE 250 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA


### Composición:

Tebuconazole .....25%  
Aditivos .....c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 253 - SENASA

### GRUPO QUÍMICO: TRIAZOL

#### Formula estructural



Fórmula empírica: C<sub>12</sub>H<sub>12</sub>ClN<sub>3</sub>O  
Peso molecular: 307.8 g/mol  
Punto de fusión: 105 °C  
Densidad: 1.249 g/ml a 20 °C  
Soluble en agua: 36 mg/litro a 20 °C  
>200 g/l Diclorometano a 20 °C  
100-200 g/l 2-Propanol a 20 °C  
50-100 g/l Tolueno a 20 °C  
2-5 g/l N-Hexano a 20 °C

Presentaciones: 250ml, 1L

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderadamente irritante a los ojos.
- Ligeramente irritante a la piel.
- Irritante a las vías respiratorias.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación de producto.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable
- No reutilizar los envases.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



### ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN:

- No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.
- No almacenar en casas de habitación.
- El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable.
- Mantener alejado del fuego y fuentes de calor.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No comer, beber o turnar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación o el reingreso a áreas tratadas (overol, guantes impermeables, botas de jébe, mascarilla, careta y gafas).
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Titular del registro:

ITAGRO S.A.

Importado y Distribuido por:

INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.  
Av. De Los Ingenieros N° 230 La Molina  
Teléfono: (01) 349-6805  
Lima - Perú

Formulado por:

SUNDAT (S) PTE Ltd.  
26 Gul Crescent Singapore 629532, Tel: (65)68612460  
Fax: (65)68620287.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



### PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Triazoles.

En caso de intoxicación por inhalación llevar a la persona afectada a un lugar ventilado y llamar a un médico y mostrarle la etiqueta.

Cuidado. Evite contacto directo. Posible carcinógeno.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y consultar a un médico. Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos buscar atención médica.

No se ha detectado antídoto específico.

### NOTA AL MÉDICO:

Lavado gástrico.  
Tratamiento sintomático y de sostén.  
Carbón activado.

En caso de emergencia toxicológica llamar a **CICOTOX**, Telf.: 328-7398;  
**ESSALUD**, Telf.: 0801- 10200 (Lima). **ITAGRO S.A.** (01) 349-6805.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para los peces, algas y crustáceos. No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos, humedales, manglares, playas, pozas de langostinos o piscigranjas con los desechos y envases vacíos.

Restringir el uso a zonas de cultivo; no aplicar en canales de riego o cerca de vegetación ribereña, áreas protegidas o silvestres.

Mantener tapado el cilindro de aplicación para evitar la volatilización.

En caso de derrame recogerlo con arena o aserrín, colocarlo en un contenedor y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**ITAZOLE 250 EW** es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles su uso está destinado a campos abiertos de cultivos de espárrago para prevenir y controlar el ataque del hongo. *Puccinia asparagi*.

**ITAZOLE 250 EW** tiene efectos sobre la síntesis del ergosterol interrumpiéndola y alterando el desarrollo del hongo.

Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando las horas de mayor radiación solar o fuertes vientos o presencia de precipitación.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

La dosis indicada se mezcla con agua en un tercio del volumen a usarse, luego agitar y completar la capacidad del recipiente, agitar de nuevo, obteniéndose una emulsión estable.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

### CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS ml / cilindro 200L	Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	150	14	0.05
Café	Roya	<i>Hemileia vastatrix</i>	200	21	0.04
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	200	35	1.50

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para el espárrago, el número de aplicaciones por campaña puede ser hasta 5.

Para café y arroz realizar 01 aplicación por campaña. Considerar 01 campaña al año.

Aplicar el producto cuando haya presencia del patógeno en el campo, rotándolo con otros productos según programa de manejo integrado de plagas.

### PERIODOS DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación

### COMPATIBILIDAD:

**ITAZOLE 250 EW** en general se aplica solo con un surfactante.

Se recomienda no mezclar **ITAZOLE 250 EW** con concentrados emulsionables.

### FITOTOXICIDAD:

**ITAZOLE 250 EW** no es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

