

# GUSADRIN®

**2.5% PS**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO SECO (DP)**

**COMPOSICIÓN:**

Diazinon ..... 25 g/Kg  
Aditivos ..... csp 1 Kg

**Registro N° 295-96-AG-SENASA**

Titular del Registro y Distribuidor:



**AGRO KLINGE S.A**

Calle René Descartes 311  
Urb. Santa Raquel-2da. Etapa. Ate. Lima-Perú.  
Telf.: 612-6565 - RUC N° 20508704217

Formulado por:



**Tecnología Química y Comercio S.A.**

Calle René Descartes N° 311,  
Urb. Santa Raquel 2<sup>da</sup> Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C N° 20307150981

**Contenido  
Neto: 1Kg**

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

Alt. total. 30 cm

Alt. de Imp. 26.5 cm

1 cm

1 cm

1 cm

22 cm

Alt. total. 30 cm  
Alt. de Imp. 26.5 cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Fosforado
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, debilidad, opresión al pecho, mareos, salivación, espasmos estomacales, diarrea, vómito, miosis.
- Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente

**ANTÍDOTO:** Administrar sulfato de atropina. No aplicar morfina, ni dar de beber leche o productos a base de aceite.

**Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 Op.4, **AGRO KLINGE A.A.:** (01)6126565

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para las abejas. Nocivo a la fauna benéfica.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: GUSADRIN 2.5% PS** es un insecticida en polvo de aplicación directa, que actúa por contacto e ingestión. Su efecto fumigante y largo poder residual, le confieren propiedades especiales en el control rápido y eficiente de los insectos del suelo.

**RECOMENDACIONES PARA SU EMPLEO: GUSADRIN 2.5% PS** se usa en espolvoreos al suelo o en el tratamiento de semillas antes de la siembra.

**1. ESPOLVOREO AL SUELO:** Aplicar **GUSADRIN 2.5% PS** manualmente o con máquina, esparciéndolo en el fondo del surco al momento de la siembra o al pie de las plantas emergidas.

**2. TRATAMIENTO DE SEMILLAS:** Espolvorear **GUSADRIN 2.5% PS** sobre las semillas, previamente humedecidas, antes de la siembra.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**USO ESPECÍFICO Y DOSIS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PAPA	"Gorgojo de los Andes" "Gusanos de tierra"	<i>Premnotrypes suturellus</i> <i>Feltia experta</i>	44 kg/ha	15	0,01
ALGODÓN	"Gorgojo de la chupadera"	<i>Eutinobothrus gossypii</i>	1-2 kg/46 kg de semilla	14	0,2
ESPÁRAGO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>	20 - 30 kg/ha	14	0,01

**L.M.R. = Límite máximo de residuos / P.C. = Período de carencia**  
Nota: **GUSADRIN 2.5% PS** también se usa para el control de la "Hormigas cortadoras" *Atta* sp. y *Acromyrmex* sp. a la dosis de 60 g/m<sup>2</sup>.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Se aplica esparciéndolo en el fondo del surco al momento de la siembra o al pie de las plántulas después de la emergencia.

**NÚMERO DE APLICACIONES MÁXIMAS POR CAMPAÑA:** 1 aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina y compuestos a base de cobre.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

® Marca Registrada

Producto Peruano

NI: 31/01/17



1 cm

1 cm

22 cm

1 cm