

CLIENTE: QUIMICA SUIZA S.A.	PANT. AMARILLO C.	
FORMATO: CAJA EVISECT - S x 200g	PANT. 293 C PANT. ROJO QUIMICA SUIZA	 
MEDIDAS: 160 mm x 110 mm x 50 mm	PROGRAMA: COREL 14	OPERADOR: JORGE QUISPE LUQUE

EVISECT®-S

EVISECT®-S

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la nereistoxina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:
CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 117

Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú



Formulado por:
Nippon Kayaku
Tokyo Fujimi Bldg., 11-2, Fujimi 1-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 102-8172, Japón



Importado y Distribuido por:
Quimica Suiza Industrial del Perú S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf. 710-400



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: **200 g**
Fecha de vencimiento:

®Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO

EVISECT®-S

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No utilice este envase para almacenar alimentos o agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbrineris spp.*), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores.

Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente., agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cil	%		
Aji, Pimiento	Gusano Perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
	Mosca Minadora	<i>Linomyza huidobrensis</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
Alcachofa	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>					
Algodón	Perforador de la hoja	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	0.5	-----	-----	15	0.02
	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>					
	Gusano menor de la hoja	<i>Anomis texana</i>					
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>	0.20-0.40	0.10-0.20	-----	N.D.	3
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>					
Gusano defoliador	<i>Copitarsia turbata</i>						
Granado	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	14	3
	Palto	Thrips del palto	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	-----	0.1		
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.70	0.35	-----	15	3
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	14	3
Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	14	3

P.C.: Período de Carencia / N.D.: No determinado / LMR: Límite máximo de residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT®-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodón debe efectuarse con estadios larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas esté afectados. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadios larvarios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

EVISECT®-S no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CLIENTE: QUIMICA SUIZA S.A.	PANT. AMARILLO C.	
FORMATO: CAJA EVISECT - S x 200g	PANT. 293 C PANT. ROJO QUIMICA SUIZA	 
MEDIDAS: 160 mm x 110 mm x 50 mm	PROGRAMA: COREL 14	OPERADOR: JORGE QUISPE LUQUE

EVISECT®-S

EVISECT®-S

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la nereistoxina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

CICOTOX: 0800-1-3040 **ESSALUD:** 117

Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú



Formulado por:
Formulaciones Químicas S.A.
CHOMES-Puntarenas
Telf.: 638-8283 - Costa Rica

Importado y Distribuido por:
Química Suiza Industrial del Perú S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf. 710-400

OSI
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: **200 g**
Fecha de vencimiento:

®Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO

EVISECT®-S

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No utilice este envase para almacenar alimentos o agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbrineris spp.*), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores.

Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente., agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cil	%		
Aji, Pimiento	Gusano Perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
	Mosca Minadora	<i>Linomyza huidobrensis</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
Alcachofa	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>					
Algodón	Perforador de la hoja	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	0.5	-----	-----	15	0.02
	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>					
	Gusano menor de la hoja	<i>Anomis texana</i>					
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>	0.20-0.40	0.10-0.20	-----	N.D.	3
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>					
Gusano defoliador	<i>Copitarsia turbata</i>						
Granado	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	14	3
	Palto	Thrips del palto	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	-----	0.1		
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.70	0.35	-----	15	3
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----		
	Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1		

P.C.: Período de Carencia / N.D.: No determinado / LMR: Límite máximo de residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT®-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodón debe efectuarse con estadios larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas esté afectados. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadios larvarios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

EVISECT®-S no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

