

Evisect®-S

Evisect®-S

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezclas y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: análogo de la nereistoxina.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel y los ojos lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a las dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

Teléfonos de emergencia toxicológica:

CICOTOX: 0800-1-3040

ALO EsSalud: 472-2300 (emergencias 24 horas)

Evisect®-S

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato 500 g/kg
Aditivosc.s.p. 1 kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Importado y Distribuido por:



QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.



Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú.
Telf. 710-4000

Titular del Registro
Arysta LifeScience
Harmony in Growth

Av. Areñales 395 of. 603, Lima 1,
Telf. 332-6633

Contenido Neto: 400 g

Formulado por:

FORMULACIONES QUIMICAS S.A.
CHOMES-Punta Arenas
Telf.: 638-8283 - Costa Rica

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



Moderadamente Peligroso DAÑINO

Evisect®-S

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Evisect-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: Lumbrineris spp.), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores. Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aprox., agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cil		
Aji, Pimiento	Gusano Perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
	Alcachofa	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.
	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>				
Algodón	Perforador de la hoja	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	0.5	—	15	0.02
	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>				
	Gusano menor de la hoja	<i>Anomis texana</i>				
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	—	0.1	N.D.	3
	Espárrago	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>	0.20-0.40	0.10-0.20	N.D.
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>				
	Gusano defoliador	<i>Copitarsia turbata</i>				
Palto	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	—	0.1	N.D.	3
	Thrips del palto	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	—	0.1	N.D.	3
Tomate	Polilla	<i>Scrobipalpa absoluta</i>	0.70	0.35	15	3
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.30-0.40	0.15-0.20		

P.C.: Período de Carencia ND.: No determinado L.M.R.: Límite máximo de residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos Evisect-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo del algodón deberá efectuarse con estadíos larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas esté afectados. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadíos larvarios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Evisect-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

Evisect-S no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en éste envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

