

10.5 cm

15 cm

10.5 cm

15 cm

10.5 cm

17 cm

10.5 cm

15 cm

10.5 cm

15 cm

10.5 cm

17 cm

ESPEJOS GRAF SAC

FECHA: 25-07-2011

VERSION: UV:1

COLORES: NEGRO

PANT. AMARILLO C.

PANT. 293 C

PANT. ROJO

QUIMICA SUIZA

OPERADOR: JORGE QUISPE LUQUE

CLIENTE: QUIMICA SUIZA S.A.

FORMATO: CAJA EVISECTCT - S x 400g

MEDIDAS: 170 mm x 150 mm x 105 mm

OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EVISECT-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbrineris spp.*), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores.

Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil	%		
Aji, Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
Alcachofa	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>					
Algodón	Perforador de la hoja	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	0.5	-----	-----	15	0.02
	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>					
	Gusano menor de la hoja	<i>Anomis texana</i>					
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	N.D.	3
Espárrago	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>	0.20-0.40	0.10-0.20	-----	N.D.	3
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>					
	Gusano defoliador	<i>Copitarsia turbata</i>					
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>					
Granado	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.15-0.20	0.075-0.1	14	3
	Thrips del pallo	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	-----	0.1	0.05	N.D.	3
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.70	0.35	-----	15	3
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	14	3
Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	N.D.	0.01
Papa	Polilla de la papa	<i>Phthorimaea operculella</i>	0.60	-----	-----	N.D.	0.01
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.20-0.30	-----	-----	N.D.	0.01

P.C.: Periodo de Carenia / N.D.: No determinado / LMR: Límite máximo de residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo.

La aplicación en el cultivo de algodonero deberá efectuarse con estadios larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas esté afectados.

En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadios larvarios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

EVISECT-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

EVISECT-S no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

EVISECT-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg

Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.

Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague

Jesús María - Lima - Perú

Formulado por:

Nippon Kayaku

1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,

Tokyo, Japón

Importado y Distribuido por:

SERFI S.A.

Av. República de Panamá 2577

La Victoria - Lima - Perú

Telf. 710-4000

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 400 g

Fecha de vencimiento:

@Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

EVISECT-S

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Análogo de la nereistoxina

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.

No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700

ESSALUD: 411-8000 Anexo 4

INFOSALUD: 0800-10-828

Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

EVISECT-S

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

No utilice este envase para almacenar alimentos o agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

ET PQUA N°109-96-AG-SENASA/003-400